



16. OBVESTILO ZA VARSTVO VINSKE TRTE - 07.04.2020 08:05 - Zaključeno



Vinska trta je v fazi brstenja. Na toplejših vinogradniških legah so brsti pri sortah, ki so zgodnejše v razvoju, že v stadiju volne (BBCH 05). V teh vinogradih lahko sedaj že opravite škropljenje z žveplovimi pripravki, ki v tem času učinkujejo na zmanjšanje populacije trsnih listnih pršic šiškaric (erinoza) in pršic trsne kodravosti (akarinoza). Škropljenje priporočamo predvsem v vinogradih, kjer ste imeli v preteklih letih več težav s pojavom omenjenih vrst škodljivcev. Uporabite lahko registrirane pripravke kot so **Cosan**, **Kumulus DF**, **Microthiol special**, **Pepelin**, **Thiovit jet** ali **Vindex 80 WG**, ki delujejo tudi proti oidiju in zmanjšujejo okužbe s črno pegavostjo vinske trte. Za optimalno delovanje žveplovih pripravkov je potrebno škropljenje opraviti v obdobju višjih temperatur zraka (vsaj 15 °C) in v suhem vremenu.

Dokler je vinska trta še v fazi nabrekanja brstov lahko za zatiranje rdeče sadne pršice in gabrove pršice opravite škropljenje s pripravkom **Red fox**, ki vsebuje mešanico parafinskega olja in bakrovega oksida. Pripravek učinkuje tudi na zmanjševanje okužb s črno listno pegavostjo.

V vinogradih bodite pozorni na pojav zemljemerke in drugih škodljivih gosenic, ki z povzročajo poškodbe z izjedanjem oces v času brstenja. Gosenice so aktivne ponoči, zato v primeru njihove prerezmnosti priporočamo preglede vinogradov v nočnem času in njihovo ročno odstranjevanje.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!

Datum objave obvestila: 07.04.2020 08:05

Obvestilo prognostičnega centra: Osrednja Slovenija/Kmetijski inštitut Slovenije

Objavil/a: Novljan Matic

Pripravil: **Matic Novljan**, **Primož Žigon**, Uredila: **Meta Zemljič**

Seznam registriranih FFS

