

30. OBVESTILO O VARSTVU VINSKE TRTE - 09.04.2020 13:53 - Zaključeno



Akarinoza (*Calepitrimerus vitis*), erinoza (*Colomerus vitis*), oidij vinske trte (*Uncinula necator*) in črna pegavost vinske trte (*Phomopsis viticola*)

V priobalnem pasu Slovenske Istre in na sončnih legah severne Primorske so zgodnje sorte vinske trte v fenofazi E po Baggioliniju ali 11–12 po BBCH lestvici. To pomeni, da je vinska trta v razvojni stopnji, ko je prvi list razprt in oddvojen od poganjka oz. je razprt že drugi list.

Za zatiranje **pršice trsne kodravosti** in **trsne listne pršice šiškarice** lahko uporabite registrirana sredstva na osnovi močljivega žvepla kot so **Cosan**, **Kumulus DF**, **Microthiol Special**, **Pepelin**, **Thiovit Jet** ali **Vindex 80 WG**. Pripravki na osnovi žvepla so še posebej učinkoviti, če je v času škropljenja temperatura zraka nad 15°C. Sredstva na osnovi močljivega žvepla delujejo tudi proti **oidiju vinske trte**.

Vinograde, kjer se je v preteklih letih pojavila **črna pegavost vinske trte** je v primeru padavin smiselno škropiti s pripravki iz spodnje razpredelnice. Okužbe s črno pegavostjo vinske trte zmanjšajo tudi sredstva na osnovi žvepla.

Pripravek	Odmerek ali koncentracija
Alleat Duo	1,5 kg/ha
Cuprablau Z 35 WG	3 kg/ha
Cuprablau Z 35 WP	3 kg/ha
Cuprablau Z Ultra WP	1,8 kg/ha
Follow 80 WG	1,9 kg/ha
Folpan 80 WDG	1,9 kg/ha
Mikal Flash	3 kg/ha
Momentum F	3 kg/ha
Polyram DF	0,3 %; največji dovoljeni odmerek 3 kg/ha
Universalis	2 l/ha

Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

Datum objave obvestila: 09.04.2020 13:53

Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Objavil/a: Devetak Marko

Pripravil: **Marko Devetak**

Seznam registriranih FFS

