

25. VARSTVO OLJNE OGRŠČICE PRED ŠKODLJIVCI - 14.04.2020 19:02 - Zaključeno



Oljna ogrščica je trenutno v fazi, ko so individualni cvetni brsti vidni a so še zaprti. Na toplejših območjih, predvsem v SV delu države, pa rastline že prehajajo v fenofazo prvih odprtih cvetov. Na nekaterih lokacijah se pojavlja **repičar** (*Meligethes aeneus*), zato priporočamo pregledovanje posevkov na prisotnost hroščev ter dinamiko odpiranja cvetnih brstov. Prag škodljivosti je presežen, kadar sta na rastlini 1-2 hrošča v času odpiranja brstov (BBCH 50), 2-3 hrošči na posamezni rastlini v času nabrekanja brstov (BBCH 55) ali 4-6 hroščev na rastlino v fazi tik pred razcvetom prvih cvetov. V kolikor je prag škodljivosti presežen priporočamo uporabo insekticidov iz skupine piretroidov: **Karate Zeon 5 CS, Kaiso EG, Karis 10 CS, Poleci, Sparviero, Fastac 100 EC, Fasthrin 10 EC, Decis 100 EC, Decis 2,5 EC, Evure, Mavrik 240 EW, Bulldock EC 25** ali drugih: **Biscaya, Daskor 440 EC** (v uporabi do **16. 4. 2020**). Nekatera od naštetih sredstev so učinkovita tudi pri zatiranju drugih škodljivcev oljne ogrščice, npr. kljunotajev, bolhačev, hrčic in drugih.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja! Zaradi varovanja čebel in drugih oprasovalcev, je potrebno škropljenje opraviti do začetka odpiranja prvih cvetov! Insekticide uporabite v nočnem času, dve uri po sončnem zahodu in največ dve uri pred sončnim vzhodom, oziroma takrat, ko so čebele v panjih.

Datum objave obvestila: 14.04.2020 19:02

Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije

Objavil/a: Urbančič Zemljič Meta

Pripravili: **Meta Urbančič Zemljič in Neja Marolt**

[Seznam registriranih FFS](#)

