

20. VARSTVO OZIMNIH ŽIT - 17.04.2020 11:25 - Zaključeno



Na območju osrednje Slovenije in Gorenjske so **ozimni ječmeni** sedaj večinoma v razvojnem stadiju prvega do drugega kolenca (BBCH 31-32), razen posameznih posevkov zelo zgodnjih sort, ki prehajajo v stadij BBCH 37, ko je že viden zastavičar. Zaradi prevladujočega sušnega vremena, ki preprečuje širjenje bolezni, je splošno zdravstveno stanje posevkov sedaj zelo dobro. Mladi razvijajoči se listi so večinoma zdravi, samo na nekaterih bolj občutljivih sortah so na tretjem ali četrtem najmlajšem listu opazna posamezna znamenja ječmenove mrežaste pegavosti ali pegavosti, ki jo povzroča gliva *Septoria nodorum*. Z izjemo nekaj ploh in neviht ob koncu tedna, tudi za prihodnji teden ni napovedane večje količine dežja, zato se z zatiranjem bolezni na splošno še vedno ne mudi. Priporočamo pregledovanje posevkov. Kjer znamenj bolezni ne opazate ali nameravate ječmen škropiti samo enkrat, z rabo fungicidov še počakajte. Raba fungicidov je smiselna samo tam, kjer se pojavljajo listne pegavosti na katerem od najmlajših treh listov na vsaj polovici rastlin.

Tudi **ozimne pšenice** so sedaj večinoma v razvojnem stadiju prvega do drugega kolenca (BBCH 31-32) in izjemoma do tretjega kolenca (BBCH 33). Posevki so zdravi in raba fungicidov še ni potrebna.

V nekaterih posevkih žit opazamo hrošče rdečega listnega strgača in že tudi poškodbe na listih ter odložena jajčeca. Na nekaterih lokacijah, kjer je škodljivec vsakoleten problem, so populacije hroščev zelo velike. V primerih, kjer je preseženo kritično število, ki je 8 do 15 hroščev/m² priporočamo, da zatirate hrošče s katerim od registriranih insekticidov.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila!

Datum objave obvestila: 17.04.2020 11:25

Obvestilo prognostičnega centra: Osrednja Slovenija/Kmetijski inštitut Slovenije

Objavil/a: Urbančič Zemljič Meta

Pripravili: **Meta Urbančič Zemljič in Neja Marolt**

[Seznam registriranih FFS](#)

