



31. VARSTVO OZIMNIH ŽIT - 20.04.2020 10:45 - Zaključeno



Ozimna žita so sedaj večinoma v obdobju kolenčenja, rastline imajo razvita dva do tri kolena, odvisno od sorte in območja pridelave, pri nekaterih zgodnjih sortah ječmenov se že kaže zastavičar. Prevladujoče sušno vreme zavira širjenje bolezni, zato je zdravstveno stanje žit sedaj večinoma dobro in se z zatiranjem bolezni v glavnem ne mudi. Kljub temu svetujemo redno pregledovanje posevkov in spremljanje zdravstvenega stanja rastlin.

V posevkih ječmena, kjer znamenj raznih pegavosti na katerem od najmlajših treh listov še ne opazate ali se le-ta pojavljajo na manj kot polovici rastlin, lahko z rabo fungicidov še nekoliko počakate. Če se bo nadaljevalo sušno vreme lahko s škropljenjem odlašate do obdobja razvoja, ko so vidne prve konice res (BBCH 41-51). Z rabo fungicidov v tem obdobju boste posevke preventivno zavarovali tudi pred ječmenovo ramularijsko pegavostjo. Omenjena bolezen se pojavi šele po klasenju, vendar je takrat za zatiranje že prepozno. Če pa znamenja raznih listnih pegavosti že opazate na katerem od najmlajših treh listov na več kot polovici rastlin, pa lahko škropljenje s fungicidi opravite že prej. Uporabite lahko katerega od fungicidov kot so **Ascra xpro**, **Elatus era**, **Elatus plus**, **Librax**, **Priaxor EC**, **Seguris xtra**, **Siltraxpro**, **Zantara** ali tudi **Mirador forte**, **Mirador xtra**, **Comrade**, **Amistar Plexeo** ali tudi pripravek **Amistar opti**, ki ni več v prodaji, vendar se morebitne zaloge lahko uporabijo do 20. maja 2020.

Tudi **ozimne pšenice in tritikale** so sedaj večinoma v razvojnem stadiju drugega do tretjega kolena (BBCH 32-33). Suho vreme ni nevarno za širjenje bolezni zato raba fungicidov še ni potrebna.

V nekaterih posevkih žit se pojavljajo **hrošči rdečega listnega strgača**, opazne so že tudi poškodbe na listih ter odložena jajčeca. Na nekaterih lokacijah, kjer je škodljivec vsakoletno navzoč, so populacije hroščev zelo velike. V primerih, kjer je preseženo kritično število, ki je 8 do 15 hroščev/m² priporočamo, da ne čakate do pojava ličink, ampak zatirate že hrošče s katerim od registriranih insekticidov.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila!

Datum objave obvestila: 20.04.2020 10:45

Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije

Objavil/a: Urbančič Zemljič Meta

Pripravili: **Meta Urbančič Zemljič in Neja Marolt**

[Seznam registriranih FFS](#)

