

24. OBVESTILO O VARSTVU KOŠČIČARJEV - 20.04.2020 10:55 - Zaključeno



Po **končanem** cvetenju koščičarjev je priporočljivo spremljati pojave škodljivcev in jih po potrebi zatirati. V nasadih češenj spremljajte pojave črne češnjeve uši, prag zatiranja je presežen, če najdete kolonije uši na več kot treh odstotkih poganjkov. Škodljivca lahko zatirate z insekticidoma **Calypso 480 SC** ali **Movento SC 100**. V nasadih sliv in češpelj, kjer ste s spremljanjem naleta češpljeve grizlice ugotovili presežen prag škodljivost, je potrebno opraviti zatiranje. Češpljeva grizlica lahko povzroči veliko škodo, saj lahko vsaka pagosenica izje tudi 5 plodičev ali več. Za zatiranje češpljeve grizlice ali listnih uši lahko uporabite insekticida kot sta **Mospilan 20 SG** in **Movento SC 100** ali insekticid **Teppeki**, ki deluje samo proti ušem.

V nasadih breskev in nektarin lahko različne škodljivce kot so siva breskova uš in drugi, zatirate z insekticidi kot so **Calypso 480 SC**, **Mospilan 20 SG**, **Pirimor 50 WG** in **Teppeki**.

Škropljenje z insekticidi opravite le, če so drevesa že popolnoma odcvetela !

Datum objave obvestila: 20.04.2020 10:55

Obvestilo prognostičnega centra: Osrednja Slovenija/Kmetijski inštitut Slovenije

Objavil/a: Novljan Matic

Pripravil: **Matic Novljan, Primož Žigon**, Uredila: **Meta Zemljič**

Seznam registriranih FFS

