



35. OBVESTILO O VARSTVU HRUŠK IN JABLAN - 24.04.2020 15:14 - Zaključeno



V večjem delu Primorske so hruške in jabolane že odcvetele. V Brkinih in na višjih legah na Tolminskem pa so jabolane še v polnem cvetenju.

Škrlup

Zaradi suhega vremena na Primorskem do sedaj še niso bili izpolnjeni pogoji za okužbe s škrlupom. Poslabšanje vremena s padavinami lahko pričakujemo začetek prihodnjega tedna. Takrat bo po vsej verjetnosti prišlo do prvega izbruha askospor ter izpolnitve pogojev za okužbe s škrlupom. Svetujemo, da še naprej spremljate vremensko napoved ter da opravite preventivno škropljenje proti škrlupu tik pred napovedanimi padavinami. V ta namen svetujemo uporabo kontaktnih fungicidov na osnovi aktivnih snovi makozeb, metiram, ditanon ali captan. V primeru napovedi daljšega obdobja nestanovitnega vremena, v nasadih, ki še cvetijo, svetujemo uporabo anilinopirimidinskih pripravkov kot so: **Chorus 50 WG**, **Mythos**, **Pyrus 400 SC**, **Scala**, **Batalion 450 SC** in **Faban**. Vsem naštetim pripravkom, razen pripravku **Faban**, je potrebno dodati kontaktni fungicid. Uporaba sistemskih fungicidov je smiselna v primeru dolgotrajnejših padavin ter v nasadih, ki so že odcveteli in imajo večjo listno maso. Uporabite lahko pripravke: **Score 250 EC**, **Difcor 250 EC**, **Mavita 250 EC** ali **Difenzone** v odmerku 0,2 L/ha ter **Duaxo koncentrat** v odmerku 1,1 L na višinski meter krošnje/ha, pri čemer najvišji dovoljeni odmerek pri enem tretiranju ne sme presegati 3,3L/ha. Naštetim pripravkom je potrebno dodati enega izmed kontaktnih fungicidov.

Kontaktni fungicidi:

Sredstvo	Odmerek, konc.	Odmerek, konc.
	HRUŠKA	JABLANA
Dithane M-45	2,0 kg/ha	2,0 kg/ha
Dithane DG Neotec	2,0 kg/ha	2,0 kg/ha
Manfil 75 WG	-	2,0 kg/ha
Manfil 80 WP	-	2,0 kg/ha
Mankoz 75 WG	2,0 kg/ha	2,0 kg/ha
Avtar 75 NT	2,0 kg/ha	2,0 kg/ha
Manfil plus 75 WG	2,0 kg /ha	2,0 kg /ha
Penncozeb 75 DG	-	2,5 kg/ha
Pinozeb M-45	-	2 kg/ha
Polyram DF	2,0 kg/ha	2,0 kg/ha
Delan 700 WG	0,75 kg/ha	0,75 kg/ha
Delan Pro	2,5 L/ha	2,5 L/ha

Jablanova pepelovka (*Podosphaera leucotricha*)

V nasadih, kjer so prisotne okužbe z jablanovo pepelovko svetujemo uporabo pripravkov: **Luna experience** v odmerku 0,75 L/ha, **Stroby WG** v odmerku 0,2 kg/ha, **Zato 50 WG** v odmerku 0,15 kg/ha, **Flint** v odmerku 0,15 kg/ha, **Tercel** v odmerku 2,5 kg/ha ali pripravek **Sercadis** v odmerku 0,25 kg/ha ali **Sercadis plus** v odmerku 0,72 L/ha. V ostalih nasadih, kjer prevladujejo na pepelovko občutljive sorte (Idared, Jonagold,...) priporočamo, da škroplilni brozgi dodate sredstva na osnovi močljivega žvepla (Cosan, Kumulus DF, Microthiol specilal, Pepelin, Thiovit jet ali Vindex 80 WG) v odmerku 5 kg/ha.

Jabolčna grizlica (*Hoplocampa testudinea*)

Takoj po cvetenju je čas za zatiranje jabolčne grizlice. Prag škodljivosti je presežen, če se v obdobju cvetenja na belo lepljivo ploščo ujame več kot 30 osic. Na opazovanih lokacijah v Vipavski dolini (Šempeter, Dombrova) so bili ulovi jabolčne grizlice letos majhni, v povprečju 5 osic/ploščo. V primeru, da v nasadu ugotovite presežen prag škodljivosti, lahko za zatiranje jabolčne grizlice uporabite pripravke: Calypso SC 480 v odmerku 0,3 L/ha, Mospilan 20 SG v 0,04 % konc. ali Neemazal T/S v odmerku 1,5 L/ha.

Pri uporabi sredstev, ki so strupena za čebele, je treba pred tretiranjem odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

Datum objave obvestila: 24.04.2020 15:14

Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Objavil/a: ROT Mojca

Pripravila: **Mojca Rot**

[Seznam registriranih FFS](#)



MKGP-UVHVR | Izjava o dostopnosti | FITO-INFO | NEOX s.p., 2014 | BRON d.o.o. © 2024