



Celjska in Koroška regija - Institut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije / Soja

/ 32. OBVESTILO O VARSTVU POSEVKOV SOJE PRED PLEVELI

32. OBVESTILO O VARSTVU POSEVKOV SOJE PRED PLEVELI - 29.04.2020 11:27 - Zaključeno



Navajamo aktualni seznam vseh dovoljenih selektivnih herbicidov za zatiranje plevelov v soji.

Preglednica selektivnih herbicidov, registriranih v RS v letu 2020, za uporabo v posevkih soje
po setvi pred vznikom soje in plevelov

Fitofarmacevtsko sredstvo, zatira plevel	Aktivna snov	F	Odmerek	Čas uporabe soja BBCH	Karenca in opombe
CENTIUM 36 CS, COMMAND 36 CS**, DR METROB KLOMAZON**, nekatere vrste O. in Š. pl.	klomazon	CS	0,25 L/ha 1,0 L/ha na VO	Preem	ČU, manjša uporaba, tretiranje takoj oz najkasneje 3 dni po setvi, **zaloge v uporabi do 30.4.2021
*DUAL GOLD 960 EC E. O. in Š. pl.	S-metolaklor	EC	1,0 - 1,3 L/ha 1,0 L/ha na VO	Preem	ČU
*EFICA 960 EC E. O. in nekatere vrste Š. pl.	S-metolaklor	EC	1,0 - 1,3 L/ha 1,0 L/ha na VO	Preem	ČU
SHARPEN 33 EC E. O. in Š. pl.	pendimetalin	EC	3,0 - 5,0 L/ha	Preem 00-09	ČU
SHARPEN 40 SC E. O. in Š. pl.	pendimetalin	SC	2,5 - 4,0 L/ha	Preem 00-09	ČU
STOMP AQUA E. O. in nekat. Š. pl.	pendimetalin	CS	2,6 L/ha	Preem	ČU, manjša uporaba

Preglednica selektivnih herbicidov, registriranih v RS v letu 2020, za uporabo v posevkih soje

po vzniku soje in plevelov

Fitofarmacevtsko sredstvo, zatira plevel	Aktivna snov	F	Odmerek	Čas uporabe soja BBCH	Karenca in opombe
*BASAGRAN 480, E. in nek. Več. Š. pl.	bentazon	SL	1,5- 2,0 L/ha	Po 11-13	60 dni, tretiranje pri temperaturah med 10 in 25 °C!
*BASAGRAN**, E. in nek. Več. Š. pl.	bentazon	SL	1,5- 2,0 L/ha	Po 11-13	60 dni, tretiranje pri temper. med 10 in 25 °C! **zaloge v uporabi do 25.8.2020
FOCUS ULTRA E. in Več. O. pl. in samosevci	cikloksidim	EC	2,0 L/ha oz 1,0 L/ha+1,0L/ha	Po 12-19	56 dni, enoletni oz. pl. in samosevci žit

žit			močila DASH HC 4,0 L/ha oz 2,0 L/ha+2,0L/ha močila DASH HC	Po 12-19	(BBCH 12-29) večletni oz. pl. visoki do 15 cm, oziroma (BBCH 13-15)
HARMONY 50 SX, E. Š. pl.	tifensulfuron- metil	SG	2 x 7,5 g/ha deljena (split) aplikacija, razmak med tretiranjema naj bo 7-14 dni	Po 10 - 14	manjša uporaba, SZ = ČU, SZK = 14 dni

Legenda: **SZ** – soja za zrnje, **SZK** – soja za zeleno krmo,

E. – enoletni, **Večl.** – večletni, **O.** – ozkolistni, **Š.** – širokolistni, **pl.** – pleveli, **Preem** - uporaba herbicidov pred vznikom posevka in plevelov, **Po** - uporaba herbicidov po vzniku posevka, razvojna faza (npr. BBCH 12) = razvita dva lista soje, **ČU**- karenca zagotovljena s časom uporabe,

Opozorilo: Za dovoljene manjše uporabe na tem seznamu učinkovitost in fitotoksičnost sredstva ni bila preverjena, zato odgovornost v zvezi z uporabo sredstva na navedenih rastlinah prevzema uporabnik sredstva!

*FFS - velja omejitve uporabe na najožjih vodovarstvenih območjih (VO1), pri pridelovalcih v izbranih KOPOP ukrepih!!!

FFS** zaloge v uporabi do...

Pri škropljenju dosledno upoštevajte vsa navodila za uporabo in omejitve!

Datum objave obvestila: 29.04.2020 11:27

Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Objavil/a: SILVO Zveplan

Pripravil: **Silvo Zveplan**

Seznam registriranih FFS

