



**36. OBVESTILO O VARSTVU POSEVKOV FIŽOLA PRED PLEVELI - 30.04.2020 11:53 - Zaključeno**



Pridelovalci fižola so v teh dneh pričeli s setvijo, zgodnejši posevki so v fazah kalitve. Navajamo aktualni seznam vseh dovoljenih selektivnih herbicidov za zatiranje plevelov v posevkih fižola.

Preglednica selektivnih herbicidov, registriranih v RS v letu 2020, za uporabo v posevkih fižola

po setvi pred vznikom fižola in plevelov

Fitofarmacevtsko sredstvo, zatira plevela	Aktivna snov	F	Odmerek	Čas uporabe fižol BBCH	Karenca in opombe
<b>BOXER</b> O. in Š. pl.	prosulfokarb	EC	<b>5,0 L/ha</b>	Preem	ČU, zagotovljena mora biti dobra pokritost semena (globina setve najmanj 8 cm)
<b>CHALLENGE</b> Š. in O. pl.	aklonifen	SC	<b>4,0 L/ha</b>	Preem BBCH 00-08	90 dni, za dobro delovanje je pomembna vlaga v tleh
<b>STOMP AQUA</b> E. O. in nekat. Š. pl.	pendimetalin	CS	<b>2,9 L/ha</b>	Preem	ČU, <b>manjša uporaba</b>

Preglednica selektivnih herbicidov, registriranih v RS v letu 2020, za uporabo v posevkih fižola

po vzniku fižola in plevelov

Fitofarmacevtsko sredstvo, zatira plevela	Aktivna snov	F	Odmerek	Čas uporabe fižol BBCH	Karenca in opombe
<b>AGIL 100 EC</b> E. in Večl. O. pl	propakvizafop	EC	<b>0,75 – 1,5 L/ha</b>	Po 13-29	60 dni
<b>*BASAGRAN 480,</b> <b>*BASAGRAN**</b> E. in nek. Večl. Š. pl.	bentazon	SL	<b>1,0 - 2,0 L/ha v deljeni (split) aplikaciji (1,0 + 1,0 L/ha), med aplikacijama 7-14 dni</b>	Po, do višine posevka največ 5 cm	42 dni, uporaba pri temperaturah do 25 °C! **zaloge v uporabi do 25.8.2020
<b>FOCUS ULTRA</b> E. O. in samosevci žit Večl. O. pl.	cikloksidim	EC	<b>2,0 L/ha oz 1,0 L/ha+1,0L/ha</b> močila DASH HC <b>4,0 L/ha oz 2,0 L/ha+2,0L/ha</b> močila DASH HC	Po 12-19  Po 12-19	56 dni fižol za suho v zrnju (suh), 28 dni fižol v stroku, enoletni oz. pl. in samosevci žit (BBCH 12-29), večletni oz. pl. visoki do 15 cm, oziroma (BBCH 13-15)
<b>FUSILADE FORTE</b> E. O. pl. in ljulk ( <i>Lolium</i> spp.)	fluazifop-p-butil	EC	<b>0,8 - 1,3 L/ha</b>	Po, pred cvetenjem do BBCH 50	90 dni fižol za suho zrnje, 28 dni fižol za stročje
<b>FUSILADE MAX</b> E. in Večl. O. pl. in ljulk ( <i>Lolium</i> spp.)	fluazifop-p-butil	EC	<b>1,6 L/ha</b>	Po, pred cvetenjem do BBCH 50	90 dni fižol za suho zrnje, 28 dni fižol za stročje

<b>ZETROLA</b>	propakvizafop	EC	0,75 – 1,5 L/ha	Po 13-39	60 dni
E. in Večl. O. pl					

**Legenda:** **E.** – enoletni, **Večl.** – večletni, **O.** – ozkolistni, **Š.** – širokolistni, **pl.** – pleveli, **Preem** - uporaba herbicidov pred vznikom posevka in plevelov, **Po** - uporaba herbicidov po vzniku posevka, razvojna faza (npr. BBCH 12) = razvita dva lista fižola, **ČU**- karencja je zagotovljena s časom uporabe.

Opozorilo: **Za dovoljene manjše uporabe na tem seznamu učinkovitost in fitotoksičnost sredstva ni bila preverjena, zato odgovornost v zvezi z uporabo sredstva na navedenih rastlinah prevzema uporabnik sredstva!**

**\*FFS - velja omejitev uporabe na najožjih vodovarstvenih območjih (WO1), pri pridelovalcih v izbranih KOPOP ukrepih! Pri škropljenju dosledno upoštevajte vsa navodila za uporabo in omejitve!**

Datum objave obvestila: 30.04.2020 11:53

Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Objavil/a: SILVO Zveplan

Pripravil: **Silvo Zveplan**

[Seznam registriranih FFS](#)