



32. VARSTVO PEČKARJEV - 04.05.2020 14:47 - Zaključeno



Jablane in hruške so odcvetele, z izjemo posameznih dreves jablane na hladnejših območjih, ki še pocvitajo. Pogostejše plohe in nevihte ustvarjajo ugodne razmere za širjenje glivičnih obolenj. Ob vsakih naslednjih obilnejših in dalj časa trajajočih padavinah lahko pričakujemo močne izbruhe askospor škrlupa. Zaradi hitrega prirasta plodičev in listne mase, sadjarjem priporočamo, da redno izvajate varstvo nasadov. Uporabite lahko enega izmed dotikalnih pripravkov kot so **Avtar 75 NT, Delan 700 WG, Delan PRO, Dithane DG Neotec, Dithane M-45, Manfil 75 WG,**

Manfil Plus 75 WG, Mankoz 75 WG, Penncozeb 75 WG, Pinozeb M-45, Polyram DF, Merpan 80 WDG, Orthocide 80 WG, Scab 80 WG, Scab 480 SC, Curatio – žvepleno apnena brozga ali **Vitisan**, slednja sta dovoljena tudi v ekološki pridelavi.

V primeru napovedi dolgotrajnih padavin je dotikalnim pripravkom smiselno dodati enega izmed sistemično delujočih pripravkov kot so **Score 250 EC, Mavita 250 EC, Difcor 250 EC Duaxo koncentrat** ali **Domark 100 EC**.

Za varstvo pred jablanovo pepelovko škropilni brozgi dodajte enega izmed žveplovih pripravkov kot so **Cosan, Kumulus DF, Microthiol special, Pepelin, Thiovit jet, Vindex 80 WG, Biotip sulfo 800 SC, Pol-Sulphur 800 SG** ali **Symbiotica Fito** – tekoče žveplo. Žveplovi pripravki so dovoljeni tudi v ekološki pridelavi. V nasadih, kjer imate težave z obvladovanjem te bolezni, lahko uporabite sredstva kot so **Luna experience, Stroby WG, Flint, Zato 50 WG, Tercel, Sercadis** ali **Sercadis plus**. Za zmanjševanje potenciala bolezni priporočamo izrezovanje in odstranjevanje okuženih poganjkov.

V obdobju **po cvetenju** je v nasadih, kjer je presežen prag škodljivosti, pomembno opraviti škropljenje pred škodljivci, ki lahko povzročijo velik izpad pridelka. Zelo veliko škode lahko v tem obdobju povzročata jabolčna grizlica in mokasta jablanova uš, prav tako tudi listne uši, krvava uš, rdeča sadna pršica, navadna pršica, hruševa rjasta pršica, bolšice idr. Za zatiranje škodljivcev v jablanovih in hruševih nasadih lahko uporabite enega izmed pripravkov kot je **Calypso SC 480, Mospilan 20 SG, Movento SC 100, Teppeki, Pirimor 50 WG** ali **Neemazal – T/S**. Slednji je primeren tudi v ekološki pridelavi jabolk.

Našteti pripravki so nevarni za čebele, zato jih uporabite le, če je sadno drevje že popolnoma odcvetelo (venčni listi so že odpadli)! Pred škropljenjem odstranite cvetočo podrast! Upoštevajte sredstvom priložena navodila in registracije posameznih pripravkov!

Datum objave obvestila: 04.05.2020 14:47

Obvestilo prognostičnega centra: Osrednja Slovenija/Kmetijski inštitut Slovenije

Objavil/a: Novljan Matic

Pripravil: **Matic Novljan, Primož Žigon, Uredila: Meta Zemljič**

[Seznam registriranih FFS](#)

