



Jugovzhodna Slovenija - Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto / Ostalo

/ 37. OBVESTILO ZA VARSTVO VRTNIN PRED LISTNIMI UŠMI

### 37. OBVESTILO ZA VARSTVO VRTNIN PRED LISTNIMI UŠMI - 07.05.2020 14:21 - Zaključeno



Ugodne temperature ter povečana vlaga vplivajo na razvoj **listnih uši**. V primeru prerazmnožitve, zaščito opravite z enim od navedenim pripravkov:

#### MOSPILAN 20 SG

- 0,25 kg/ha (2,5 g/100 m<sup>2</sup>) v papriki, paradižniku, jajčevcih, solati, kumarah, bučkah in drugih bučnicah z užitno lupino
- 0,125 – 0,15 kg/ha (1,25 – 1,5 g/100 m<sup>2</sup>) v bučah in drugih bučnicah z neužitno lupino

#### PIRIMOR 50 WG:

- 0,75 kg/ha (7,5 g/100 m<sup>2</sup>) v paradižniku, papriki, jajčevcih, bučah, bučkah, kumarah, dinjah in lubenicah v zaščiteneh prostorih, fižolu, grahu, korenju, peteršilju
- 0,5 kg/ha (5 g na 100 m<sup>2</sup>) v solati na prostem in v zaščiteneh prostorih
- 0,42 kg/ha (4,2 g na 100 m<sup>2</sup>) v brstičnem ohrovtu in glavnatem zelju

#### KARATE ZEON 5 CS

- 0,15 l na ha (1,5 ml na 10 l/100 m<sup>2</sup>), v poru, zeleni, grahu, stročjem fižolu, papriki, paradižniku, jajčevcih, špinači, kumarah

#### BIOTIP FLORAL

- 20 ml/10 l vode na 125 m<sup>2</sup> v paradižniku in jajčevcih na prostem in v zaščiteneh prostorih
- 20 ml/10 l vode na 125 m<sup>2</sup> v papriki in kumarah v zaščiteneh prostorih
- 27 ml/10 l vode na 167 m<sup>2</sup> v solati na prostem
- 20 ml/10 l vode na 167 m<sup>2</sup> v solati v zaščiteneh prostorih

#### CALYPSO SC 480

- v 0,03 % koncentraciji (3 ml/10 l vode), v paradižniku, jajčevcih in papriki
- v 0,02 % koncentraciji (2 ml/10 l vode), v kumarah, dinjah in lubenicah

#### CLOSER

- 200 ml/ha (2 ml/100 m<sup>2</sup>), pri porabi 200 do 1500 l vode na ha v jajčevcih, bučkah, kumarah, kumaricah, dinjah, papriki, čiliju, bučah, paradižniku in lubenicah v zaščiteneh prostorih (rastlinjakih)
- 200 ml/ha (2 ml/100 m<sup>2</sup>), pri porabi 200 do 1000 l v brokoli, brstičnem ohrovtu, zelju, kitajskem zelju, solati in špinači na prostem

#### NATURALIS

- 200 - 600 l/ha, v solati, endiviji in radiču na prostem in v zaščiteneh prostorih

#### NEEMAZAL - T/S

- 3,0 l/ha in porabi 500 do 800 l vode na ha v zelju, ohrovtu, brstičnem ohrovtu špinači in njej sorodnih vrstah, na prostem
- 2,5 l/ha in porabi 800 l vode v na bučnicah z užitno in neužitno lupino, paradižniku in jajčevcih na prostem in v zaščiteneh prostorih, ter na papriki v zaščiteneh prostorih

#### BULLDOCK

- 0,3 - 0,5 l/ha (3 - 5 ml na 100 m<sup>2</sup>) na glavnatem zelju, kitajskem zelju in ohrovtu

#### TEPPEKI

- 0,1 kg/ha pri porabi vode 400 do 1000 l/ha v kumarah, bučkah, bučah, dinjah in lubenicah na prostem in v zaščiteneh prostorih.

**Pri uporabi fitofarmaceutskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. V primeru uporabe insekticidnih sredstev bodite še posebno pozorni na varovanje čebel in ostalih opraševalcev.**

Datum objave obvestila: 07.05.2020 14:21

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: PETERLIN Andreja

Pripravila: Peterlin Andreja

Seznam registriranih FFS

