



41. VARSTVO OZIMNE PŠENICE - 18.05.2020 13:35 - Zaključeno



Ozimne pšenice so sedaj večinoma že sklasi in prehajajo v fazo cvetenja, razvoj je odvisen od sorte in območja pridelave. Ko je klas enkrat zunaj je izpostavljen različnim glivičnim okužbam, najbolj škodljive so okužbe s fuzarijskimi glivami, ki poleg nižjega pridelka povzročajo onesnaženost zrnja z mikotoksini. Nevarno obdobje za okužbe klasov s fuzariozami je od konca klasenja do konca cvetenja (BBCH 59-69), tveganje je večje v deževnem vremenu in na njivah, kjer v kolobarju pšenica sledi koruzi. Priporočamo, da posevke pšenice čimprej po zaključenem klasenju zavarujete s katerim od triazolnih pripravkov kot so **Prosaro**, **Caramba**, **Plexeo**, **Sirena** in podobni.

V posevkih spremljajte tudi razvoj **rdečega žitnega strgača**. Okvirni prag zatiranja ličink je 1 ličinka na posamezno bil. Za zatiranje lahko uporabite katerega od pripravkov kot so **Biscaya**, **Bulldock 25 EC**, **Fastac 100 EC**, **Decis**, **Karate zeon**, **Kaiso EG**, **Poleci**, **Sparviero**, **Evure**, **Mavrik 240** in podobni.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!

Datum objave obvestila: 18.05.2020 13:35

Obvestilo prognostičnega centra: Osrednja Slovenija/Kmetijski inštitut Slovenije

Objavil/a: Urbančič Zemljič Meta

Pripravili: **Meta Urbančič Zemljič in Neja Marolt**

[Seznam registriranih FFS](#)

