

42. OBVESTILO O VARSTVU KROMPIRJA PRED BOLEZNIMI - 20.05.2020 13:59 - Zaključeno



KROMPIRJEVA PLESEN (*Phytophthora infestans* de Bary)

Na območju Spodnje Savinjske doline, Koroške in Celjske regije so nasadi krompirja v povprečju v fazah tvorbe listov. V zgodaj posajenih ali v začetku vegetacije pokritih krompiriščih s kopreno je krompir že v fenofazah, ko glavno steblo tvori bazalne stranske poganjke nad in pod zemljo do začetka sklepanja vrst. Ekološke razmere za razvoj krompirjeve plesni so ugodne, kar potrjuje tudi dinamika naraščanja kumulativne fitoftorne vrednosti, katera je na eni od opazovanih lokacij danes že dosegla indeks 150. Na ostalih lokacijah se kumulativni indeksi gibljejo med 128,7 in 147,3. Dnevni indeksi so se na opazovanih lokacijah 20. maja gibali od 11,6 do 16,4. Priporočamo, da v nasadih krompirja, kjer vrste še niso sklenjene in ni znakov bolezni opravite preventivna škropljenja z enim od spodaj navedenih preventivnih kontaktnih fungicidov. Fungicidi označeni z dvema zvezdicama za imenom (FFS**) so registrirani tudi za zatiranje črne listne pegavosti krompirja (*Alternaria solani*). V času pogostih padavin moramo biti pozorni na izpiranje kontaktnih fungicidov!

Preglednica 1: Kontaktni fungicidi registrirani za zatiranje krompirjeve plesni na krompirju v Sloveniji v letu 2020

KONTAKTNI FUNGICIDI			
Fitofarmacevtsko sredstvo	Aktivna snov (%)	Odmerek (kg, L /ha)	Karenca (dni)
AVTAR 75 NT**	mankozeb 75	2,0	7
BADGE WG	Cu – bakrov hidroksid 24,4 + Cu – bakrov oksiklorid 24,5	3,0	7
CUPRABLAU Z 35 WG	Cu – bakrov oksiklorid 35	2,1	14
CUPRABLAU Z 35 WP**	Cu – bakrov oksiklorid 35	3,0	14
DITHANE DG Neotec**	mankozeb 75	2,0	7
DITHANE M-45**	mankozeb 80	2,0	7
ENERVIN	ametoktradin 12 + metiram 44	2,0	7
FROWNCIDE	fluazinam 50	0,4	7
MANFIL 75 WG	mankozeb 75	2,0	7
MANFIL 80 WP	mankozeb 80	2,0	7
MANFIL PLUS 75 WG**	mankozeb 75	2,0	7
MANKOZ 75 WG** (zaloge v uporabi do 31.7.2021)	mankozeb 75	2,0	7
NORDOX 75 WG	Cu – bakrov oksid 75	1,0	14
PENNCOZEB 75 DG	mankozeb 75	1,7	7
PINOZEB M-45	mankozeb 80	2,0	7
POLYRAM DF	metiram 70	2,0	21
RANMAN TOP	ciazofamid 16	0,5	7
SHIRLAN 500 SC	fluazinam 50	0,4	7
WINBY	fluazinam 50	0,4	7

Ob višjih temperaturah in pogostih padavinah ter posledično visoki relativni zračni vlažnosti bodo zelo ugodni pogoji za razvoj

bolezni. Zato priporočamo, da v krompiriščih, kjer so se vrste že začele sklepati, opravite škropljenje z enim od fungicidov, ki imajo *sistemično, polsistemično* ali *translaminarno* delovanje.

Uporabite lahko enega od spodaj navedenih polsistemičnih oz. sistemskih fungicidov. Infinito priporočamo za zaključna škropljenja. Ranman top je preventivni kontaktni fungicid, a ga priporočamo za uporabo tudi v času, ko uporabljamo polsistemične in sistemične. V nasadih zgodnjega krompirja dajte prednost pripravkom s krajšo karenčno dobo. Bakrove fungicide priporočamo v ekološki pridelavi vso rastno dobo, v integrirani pridelavi pa ob koncu vegetacije ali kot dodatek (1kg/ha) do konca julija fungicidom na osnovi mankozeba, propineba, klorotalonila ali metirama, ali fungicidom Acrobat MZ WG**, Forum MZ**, Shirlan 500 SC in Electis 75 WG.

Preglednica 2: Sistemski, polsistemski in translaminarni fungicidi registrirani za zatiranje krompirjeve plesni na krompirju v Sloveniji v letu 2020.

SISTEMIČNI, POLSISTEMIČNI IN TRANSLAMINARNI FUNGICIDI			
Fitofarmacevtsko sredstvo	Aktivna snov (%)	Odmerek (kg, L/ha)	Karenca (dni)
ACROBAT MZ WG**	dimetomorf 9 + mankozeb 60	2,0	7
ARMETIL M	mankozebe 64 + metalaksil 8	2,5	21
BANJO FORTE	dimetomorf 20 + fluazinam 20	1,0	7
CARIAL FLEX	cimoksanil 18 + mandipropamid 25	0,6	7
COPFORCE EXTRA	Cu - bakrov hidroksid 30 + cimoksanil 6	2,0	14
CURZATE C EXTRA (zaloge v uporabi do 30.6.2021)	Cu - bakrov hidroksid 25 + cimoksanil 6	2,0	28
CURZATE M 72,5 WG	cimoksanil 4,5 + mankozeb 68	2,3	14
CURZATE PARTNER + (dodati kontaktni fungicid)	cimoksanil 60	0,15	1 oz. K kontakt. fungicida
CYMBAL	cimoksanil 45	0,2 – 0,25	7
ELECTIS 75 WG	mankozebe 66,7 + 8,3 zoksamid	1,5 – 1,8	7
EQUATION PRO	cimoksanil 30 + famoksadon 22,5	0,4	14
FORTUNA GOLD	cimoksanil 4 + mankozeb 40	3,0	14
FORUM MZ WG**	dimetomorf 9 + mankozeb 60	2,0	7
FUDAN GOLD	cimoksanil 4 + mankozeb 40	3,0	14
GALBEN M (zaloge v uporabi do 16.1.2021)	benalaksil 8 + mankozeb 65	2,5	28
GETT**	mandipropamid 5 + mankozeb 60	2,5	7
INFINITO	fluopikolid 6,25 + propamokarb 62,5	1,2 – 1,6	7
MOXIMATE 725 WG	cimoksanil 4,5 + mankozeb 68	2,5	7
MOXIMATE 725 WP	cimoksanil 4,5 + mankozeb 68	2,5	7
MOXIMATE PLUS	cimoksanil 4,5 + mankozeb 68	2,5	7
NAUTILE DG	cimoksanil 5 + mankozeb 68	2,0	7
NAUTILE WP	cimoksanil 4,5 + mankozeb 65	2,25	21
ORVEGO	ametoktradin 30 + dimetomorf 22,5	0,8	7
PERGADO MZ**	mandipropamid 5 + mankozeb 60	2,5	7

PROFILUX	cimoksanil 4,5 + mankozeb 68	2,5	7
PROXANIL 450 SC	cimoksanil 5 + propamokarb hidroklorid 40	2,0 - 2,5	14
REBOOT	cimoksanil 33 + zoksamid 33	0,45	7
REVUS	mandipropamid 25	0,6	3
*RIDOMIL Gold MZ Pepite	mankozebl 64 + metalaksil-M 3,88	2,5	21
RIVAL DUO	cimoksanil 5 + propamokarb hidroklorid 40	2,5	14
SACRON 45 DG + (dodati kontaktni fungicid)	cimoksanil 45	0,22	14
TANOS 50 WG	cimoksanil 25 + famoksadon 25	0,7	14
VALIS M	valifenalat 6 + mankozeb 60	2,5	7

Za fungicide označene z zvezdico pred imenom (*FFS) velja omejitev uporabe na najožjih vodovarstvenih območjih (VVO1), pri pridelovalcih v izbranih KOPOP ukrepih!!!

Pri škropljenju dosledno upoštevajte navodila za uporabo FFS!

Datum objave obvestila: 20.05.2020 13:59

Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Objavil/a: SILVO Zveplan

Pripravil: **Silvo Zveplan**

[Seznam registriranih FFS](#)

