



46. VARSTVO ŽIT - 22.05.2020 12:22 - Zaključeno



Ozimne pšenice so večinoma že sklasi ali bodo v teh dneh in prehajajo v fazo cvetenja, njihov razvoj je odvisen od sorte in lege. Klas in zgornje etaže listov so ob nestanovitnem vremenu izpostavljeni različnim glivičnim okužbam. Škodljive so predvsem **fuzarijske okužbe klasov**, nevarno obdobje za infekcije je od konca klasenja do konca cvetenja (BBCH 59-69). Priporočamo, da posevke pšenice čimprej po zaključenem klasenju zavarujete s fungicidom, s čimer boste zavarovali klase pred fuzariozami in podaljšali zaščito zgornjih etaž listov pred **septorijskimi pegavostmi**.

Priporočamo rabo triazolnih fungicidov, predvsem kombinacije s protiokonazolom in metkonazolom (**Prosaro, Caramba, Plexeo, Sirena**), lahko pa uporabite tudi pripravke s tebukonazolom kot so **Magnello, Zamir** in podobni.

V posevkih žit spremljajte tudi pojave **rdečega žitnega strgača** in **listnih uši**. Za zatiranje škodljivcev lahko uporabite katerega od pripravkov kot so **Biscaya, Bulldock 25 EC, Fastac 100 EC, Decis, Karate zeon, Karis 10 CS, Mavrik 240, Poleci** in podobni.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!

Datum objave obvestila: 22.05.2020 12:22

Obvestilo prognostičnega centra: Osrednja Slovenija/Kmetijski inštitut Slovenije

Objavil/a: Urbančič Zemljič Meta

Pripravili: **Meta Urbančič Zemljič in Neja Marolt**

[Seznam registriranih FFS](#)

