



52. VARSTVO PEČKARJEV - 25.05.2020 11:47 - Zaključeno



Sadjarjem priporočamo nadaljevanje preventivnega varstva drevja pred jablanovim škrlupom. Nestanovitno vreme ustvarja dobre razmere za okužbe z jablanovim škrlupom. Fungicidno oblogo obnavljajte na 5 do 7 dni, oziroma pred napovedanimi padavinami. V tem času dajte prednost pripravkom na osnovi aktivne snovi dithianon **Delan 700 WG in Delan PRO**, lahko pa uporabite tudi katerega izmed ostalih dotikalnih pripravkov kot so **Avtar 75 NT, Dithane DG Neotec, Dithane M-45, Manfil 75 WG, Manfil Plus 75 WG, Mankoz 75 WG, Penncozeb 75 WG, Pinozeb M-45, Polyram DF, Merpan 80 WDG, Orthocide 80 WG, Scab 80 WG, Scab 480 SC, Curatio** – žvepleno apnena brozga ali **Vitisan**, slednja sta dovoljena tudi v ekološki pridelavi.

Uporaba sistemsko delujočih pripravkov kot so **Score 250 EC, Mavita 250 EC, Difcor 250 EC, Duaxo koncentrat** ali **Domark 100 EC** je upravičena le izjemoma, ko je izvajanje pravočasnega varstva z dotikalnimi pripravki onemogočeno.

V primeru pojava neurij s točo, ki bi poškodovala nasade, dajte prednost uporabi pripravkom na osnovi **kaptana** kot so **Merpan 80 WDG, Orthocide 80 WG, Scab 80 WG, Scab 480 SC**.

Za varstvo pred jablanovo pepelovko priporočamo dosledno izrezovanje okuženih poganjkov in dodajanje škropilni brozgi enega izmed **žveplovih pripravkov**. Žveplovi pripravki so dovoljeni tudi v ekološki pridelavi. V nasadih, kjer imate težave z obvladovanjem te bolezni, lahko uporabite tudi sredstva kot so **Luna experience, Stroby WG, Flint, Zato 50 WG, Tercel 100 EC, Topaze Topas Sercadis** ali **Sercadis plus**. Škropljenje opravite po izrezovanju okuženih poganjkov!

Jabolčni zavijač

Večerne temperature v preteklem tednu na večini opazovanih lokacij niso bile ugodne za razvoj jabolčnega zavijača. Ulovi na feromonske vabe so med sadovnjaki različni, a kontinuirani. Na hladnejših območjih je še vedno primeren termin za uporabo pripravkov **Harpun** in **Insegar 25 WG**. Za zatiranje gosenic jabolčnega zavijača na toplejših območjih pa je sedaj primeren termin za uporabo pripravka **Coragen** ali **Exirel**.

V sadovnjakih, kjer ste imeli v lanskem letu težave z obvladovanjem jabolčnega zavijača, priporočamo dodajanje pripravka **Madex max, Carpovirusine** v polovičnem odmerku. Virusni pripravki fiziološko slabijo gosenice.

Ekološki pridelovalci lahko za zatiranje jabolčnega zavijača uporabite pripravek **Madex max, Carpovirusine** ali **Laser plus**, slednji dobro zatira tudi gosenice drugih škodljivih zavijačev. V ekoloških nasadih, kjer imate pogosto škodo zaradi drugih zavijačev priporočamo, da škropilni brozgi dodate pripravek na osnovi *Bt*, kot je **Agree, Lepinox plus** ali **Delfin WG**.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila in registracije posameznih pripravkov! Pred škropljenjem pokosite cvetočo podrast!

Datum objave obvestila: 25.05.2020 11:47

Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije

Objavil/a: Novljan Matic

Pripravil: **Matic Novljan, Primož Žigon**, Uredila: **Meta Zemljič**

[Seznam registriranih FFS](#)

