

57. OBVESTILO O VARSTVU JABLAN IN HRUŠK - 29.05.2020 14:00 - Zaključeno



V večjem delu Primorske so hruške in jabolane v fazi debeljenja in sekundarnega odpadanja plodičev (BBCH 72 - 73).

Škrlup

V začetku tedna je na Primorskem padlo od 10 do 15 mm padavin, pri tem so bi na nekaterih lokacijah izpolnjeni pogoji za srednje do močne okužbe s škrlupom (Zavrhek, Sužid). Drugod kljub padavinam ni bilo pogojev za okužbe. Svetujemo, da še naprej redno spremljate vremenske razmere in napoved vremena ter opravljate redna škropljenja proti škrlupu s kontaktnimi fungicidi pred napovedanimi padavinami.

V primeru dolgotrajnih in obilnih padavin svetujemo, uporabo sistemičnih pripravkov kot so **Score 250 EC**, **Difcor 250 EC**, **Mavita 250 EC** ali **Difenzone** v odmerku 0,2 L/ha ter **Duaxo koncentrat** v odmerku 1,1 L na višinski meter krošnje/ha, pri čemer najvišji dovoljeni odmerek pri enem tretiranju ne sme presegati 3,3L/ha. Naštetim pripravkom je potrebno dodati enega izmed kontaktnih fungicidov.

Kontaktni fungicidi:

Sredstvo	Odmerek, konc.	Odmerek, konc.
	HRUŠKA	JABLANA
Dithane M-45	2,0 kg/ha	2,0 kg/ha
Dithane DG Neotec	2,0 kg/ha	2,0 kg/ha
Manfil 75 WG	-	2,0 kg/ha
Manfil 80 WP	-	2,0 kg/ha
Mankoz 75 WG	2,0 kg/ha	2,0 kg/ha
Avtar 75 NT	2,0 kg/ha	2,0 kg/ha
Manfil plus 75 WG	2,0 kg /ha	2,0 kg /ha
Penncozeb 75 DG	-	2,5 kg/ha
Pinozeb M-45	-	2 kg/ha
Polyram DF	2,0 kg/ha	2,0 kg/ha
Delan 700 WG	0,75 kg/ha	0,75 kg/ha
Delan Pro	2,5 L/ha	2,5 L/ha

Jablanova pepelovka (*Podosphaera leucotricha*)

V nasadih, kjer so prisotne okužbe z jablanovo pepelovko svetujemo uporabo pripravkov: **Luna experience** v odmerku 0,75 L/ha, **Stroby WG** v odmerku 0,2 kg/ha, **Zato 50 WG** v odmerku 0,15 kg/ha, **Flint** v odmerku 0,15 kg/ha, **Tercel** v odmerku 2,5 kg/ha ali pripravek **Sercadis** v odmerku 0,25 kg/ha ali **Sercadis plus** v odmerku 0,72 L/ha. V ostalih nasadih, kjer prevladujejo na pepelovko občutljive sorte (Idared, Jonagold,...) priporočamo, da škroplilni brozgi dodate sredstva na osnovi močljivega žvepla (Cosan, Kumulus DF, Microthiol specilal, Pepelin, Thiovit jet ali Vindex 80 WG) v odmerku 5 kg/ha. Pred škropljenjem je potrebno porezati plesnive poganjke in jih odstraniti iz nasada.

Jabolčni zavijač

Ulovi jabolčnega zavijača so bili v zadnjem tednu v večjem delu Primorske pod pragom škodljivosti, izjema je lokacija Dombrava, kjer je bil prag 10 metuljkov na vabo presežen. Ponovno škropljenje proti jabolčnemu zavijaču svetujemo samo na tistih lokacijah, kjer je od zadnjega škropljenja minilo več kot 14 dni in je hkrati presežen prag škodljivosti (10 metuljkov/feromonsko vabo/teden). Uporabite lahko enega izmed naštetih pripravkov: **Delegate 250 EG** v odmerku 0,3 kg/ha, **Laser plus** v odmerku 0,3 L/ha, **Imidan 50 WG** v odmerku 1,0 kg/ha ali pripravek **Steward** v odmerku 225 g/ha. V nasadih, kjer se pojavljajo tudi listne uši lahko uporabite tudi pripravek **Mospilan 20 SG** v odmerku

0,4 kg/ha ali Calypso SC 480 v odmerku 0,3 L/ha.

Pri uporabi čebelar nevarnih sredstev, je potrebno odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja.

Marmorirana smrdljivka

V nasadih hrušk in jablan se že pojavlja marmorirana smrdljivka. Odrasle stenice se dopolnilno hranijo na poganjkih in plodičih, nadaljuje se obdobje parjenja. Opazili smo tudi že prva odložena jajčna legla. Populacije škodljivca so zaenkrat še majhne, zato ukrepanje proti škodljivcu zdaj še ni potrebno.

Datum objave obvestila: 29.05.2020 14:00

Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Objavil/a: ROT Mojca

Pripravila: **Mojca Rot**

[Seznam registriranih FFS](#)

