

60. VARSTVO KROMPIRJA - 01.06.2020 11:06 - Zaključeno



Ob nadaljevanju nestalnega vremena s pogostimi padavinami se nadaljujejo tudi ugodne razmere za razvoj krompirjeve plesni. Pridelovalcem priporočamo, da redno pregledujete nasade krompirja in jih varujete s fungicidom.

V sedanjem obdobju hitre rasti priporočamo predvsem rabo fungicidov s sistemskim delovanjem kot sta **Infito** (karenca 7 dni) ali **Proxanil 450 CS** (karenca 14 dni). Pripravek **Ridomil gold MZ pepite** (karenca 21 dni) svetujemo samo za prvo škropljenje, pred pojavom plesni kjerkoli v območju pridelave. Kasneje njegovo rabo odsvetujemo zaradi nevarnosti razvoja odporne plesni. Uporabite lahko tudi fungicide **Ranman top** ali **Orvego** (karenca 7 dni), ki sta manj podvržena izpiranju ali katerega od fungicidov z delnim sistemskim oz. translaminarnim delovanjem, kot so pripravki z dimetomorfom (**Acrobat MZ WG**, **Forum MZ WG**, **Banjo forte** - vsi imajo karenc 7 dni), mandipropamidom (**Pergado MZ**, **Gett** - oba s karenc 7 dni in **Revus** s karenc 3 dni) ali cimoksanilom (**Moximate**, **Reboot** s karenc 7 dni, **Nautile**, **Equation pro** s kartenco 14 dni, in drugi). V nasadih zgodnjega krompirja bodite pozorni na karence!

Spremljajte tudi razvoj koloradskega hrošča. Za zatiranje ličink lahko uporabite katerega od pripravkov kot so **Alverde**, **Biscaya**, **Bulldock EC 25**, **Calypso SC 480**, **Coragen**, **Mavrik 240**, **Mospilan 20 SG** podobni. Ekološki pridelovalci lahko uporabite **Raptol** koncentrat, **Laser plus** ali **Neemazal-T/S**.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila!

Datum objave obvestila: 01.06.2020 11:06

Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije

Objavil/a: Urbančič Zemljič Meta

Pripravili: **Meta Urbančič Zemljič in Neja Marolt**

[Seznam registriranih FFS](#)

