

## 49. VARSTVO VINSKE TRTE - 03.06.2020 16:25 - Zaključeno



### Fenološki razvoj vinske trte

Na območju vinorodnega pod okoliša Šmarje – Virštanj, Slovenskih Konjic in Spodnje Savinjske doline je fenološki razvoj vinske trte zelo izenačen. Vinska trta je v povprečju na opazovane lokacije in sorte v fenološki fazi BBCH 57, ko so socvetja popolnoma razvita in cvetovi ločeni.

### Peronospora in oidij vinske trte

Vremenoslovci v prihodnjih dneh napovedujejo sorazmerno toplo, a nestanovitno vreme s pogostimi plohami in nevihtami ter možnostjo krajevnih nalivov. Tako bodo ustvarjeni ugodni pogoji za nove primarne okužbe s peronosporo vinske trte.

Poskrbite za preventivno zaščito vinske trte in pred obilnejšimi padavinami opravite škropljenje proti peronospori. Škropljenje opravite z enim od kombiniranih, sistemsko ali polsistemsko delujočih pripravki kot so: **Forum star** (1,6 kg/ha), **Sfinga Extra WDG** (1,5 kg/ha), **Forum MZ WG** (2,5 kg/ha), **Acrobat MZ** (2,5 kg/ha), **Orvego** (0,8 L/ha), **Moximate 725 WG**, **Profilux** (1,25 kg/ha), **Nautil DG** (2,4 kg/ha), **Fortuna gold** (1,5 kg/ha), **Fudan gold** (1,5 kg/ha), **Equation pro** (0,4 kg/ha), **Tanos 50 WG** (0,4 kg/ha), **Cymbal** (0,125 kg/ha), **Twingo** (3 kg/ha), **Enervin** (2,5 kg/ha), **Reboot** (0,4 kg/ha), **Electis 75 WG** (1,5 – 1,8 kg/ha), **Emendo F** (1,5 kg/ha), **Valis F** (1,5 kg/ha), **Valis M** (2 kg/ha), **Folpan gold** (2 kg/ha), **Ridomil Gold MZ Pepite** (2,5 kg/ha) ali **Armel M** (2,5 kg/ha). Pazite na razmike med škropljenji, ti naj ne bodo daljši od 8 do 10 dni.

Pripravkoma **Equation pro** in **Cymbal** priporočamo dodati polovični odmerek enega od kontaktnih fungicidov.

Uporabite lahko tudi enega od pripravkov kot so: **Mildicut** (2L/ha), **Videryo F** (2,5 L/ha), **Daimyo F** (2,5 L/ha) ali **Vincy F** (2,5 L/ha) ali pripravka na osnovi kalijevaga fosfonata **Sorale LX** oz. **LBG -01F34** (4 L/ha- pri samostojni rabi ali 3 L/ha – pri kombinirani uporabi s fungicidi na osnovi a.s. folpan ali mankozeb). Pri uporabi slednjih prilagodite razmik med škropljenji količini padavin in pazite, da razmik med škropljenji ne bo daljši od 7 dni.

V času prehoda vinske trte v fazo polnega cvetenja lahko v zdravih vinogradih dajte prednost pripravkom kot so: **Alleato 80 WG** (2,5 kg/ha), **Mikal flash** (4 kg/ha), **Alleato duo** (2-3 kg/ha), **Mikal premium F** (3 kg/ha), **Momentum trio** (3kg/ha) ali **Magma triple WG** (3kg/ha).

Ob otoplitvi vremena se ustvarjajo tudi pogoji za okužbe z **oidijem vinske trte**. Za preprečevanje okužb priporočamo uporabo enega od naslednjih pripravkov: **Collis** (0,4 L/ha), **Luna Experience** (0,375 L/ha), **Luna max** (1L/ha), **Falcon EC 460** (0,4 L/ha), **Misha 20 EW** (0,23 L/ha), **Karathane Gold 350 EC** (0,5 L/ha), **Kusabi 300 SC** (0,25 L/ha), **Topas 100 EC** (0,3L/ha), **Topaze** (0,3 L/ha), **Score 250 EC** (0,2 L/ha), **Mavita 250 EC** (0,2 L/ha), **Spirox D** (0,5 L/ha), **Sercadis** (0,15 L/ha), **Crystal** (0,16 L/ha), **Unicorn DF** (2,2 kg/ha) ali uporabite pripravke, ki vsebujejo samo aktivno snov tebukonazol kot so: **Folicur EW 250** (0,4 L/ha), **Orius 25 EW** (0,4 L/ha), **Mystic 250 EC** (0,4 L/ha.), **Tebusha 25%EW** (0,4 L/ha), **Baltazar** (0,4 L/ha) ali **Star Tebukonazol** (0,4 L/ha).

Po vstopu vinske trte v fazo cvetenja pa lahko uporabite pripravke: **Domark 100 EC** (0,3 L/ha), **Custodia** (0,35 L/ha) ali **Systhane 20 EW** (0,14 L/ha).

Uporabite lahko tudi pripravek **Cabrio Top** (2,0 L/ha), ki deluje tudi na peronosporo vinske trte.

Prav tako lahko dodate pripravke na osnovi močljivega žvepla kot so: **Cosan**, **Kumulus DF**, **Microthiol special**, **Pepelin**, **Thiovit Jet** ali **Vindex 80 WG** - v odmerku 3 do 8 kg/ha ali **Biotip Sulfo 800 SC**, **Pol- Sulphur 80 WG**, **WP**, **Pol- Sulphur 800 SC**, **Symbiotica fito – granulirano žveplo**, **Symbiotica fito – tekoče žveplo** - v odmerku 4L/ha. Ob pojavu okužbe lahko uporabite tudi **Cosinus**, **Cosavet DF** ali **Močljivo žveplo Karsia DF** v odmerku do 8 kg/ha.

### Ameriški škržatek

19. maja smo našli prve ličinke ameriškega škržatka, prenašalca zlate trsne rumenice. V vinogradih zdaj najdemo ličinke L1 razvojnega stadija. O rokih zatiranja in uporabi primernih insekticidov vas bomo pravočasno obvestili.

**V primeru toče** dajte pri škropljenju prednost pripravkom, ki vsebujejo aktivno snov **folpet** kot so: **Forum star**, **Sfinga Extra WDG**, **Folpan gold**, **Valis F**, **Emendo F**, **Videryo F**, **Daimyo F**, **Vincy F**, **Mikal flash**, **Momentum F**, **Alleato duo**, **Mikal premium F**, **Momentum trio** ali **Magma triple WG**

Datum objave obvestila: 03.06.2020 16:25

Obvestilo prognoističnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus

Pripravila: **Alenka Ferlež-Rus**

[Seznam registriranih FFS](#)



MKGP-UVHVR | Izjava o dostopnosti | FITO-INFO | NEOX s.p., 2014 | BRON d.o.o. © 2024