



66. OBVESTILO O VARSTVU KROMPIRJA - 10.06.2020 09:19 - Zaključeno



V Vipavski dolini prvi zgodnji krompir že izkopavajo, poznejši krompir pa je v fazi sklepanja vrst, bujne rasti in začetka cvetenja. V ostalih višjih predelih Primorske pa pozni krompir večinoma še ni sklenil vrst. Že v preteklem tednu smo našli prve okužbe s **krompirjevo plesnijo**, zato je bila potrebna zaščita poznih nasadov pred začetkom padavin. Deževno in vlažno in relativno toplo vreme sedaj nudi izredno ugodne pogoje za širitev krompirjeve plesni. V priloženem seznamu so navedeni registrirani fungicidi za varstvo krompirja pred krompirjevo plesnijo in črno listno pegavostjo krompirja. Pred uporabo fungicida obvezno preberite in upoštevajte NAVODILO O UPORABI!

V Slovenski Istri in Vipavski dolini prvi zgodnji krompir že izkopavajo, poznejši krompir pa je v fazi sklepanja vrst, bujne rasti in začetka cvetenja. Kasneje sajeni posevki poznih sort v višjih predelih Primorske še niso sklenili vrst, zato je pri njih nevarnost pojava krompirjeve plesni nekoliko manjša. Poleg velike nevarnosti širitve okužbe s krompirjevo plesnijo je obilica padavin in razmočena topla tla ugodni medij za razvoj bakterijskih bolezni krompirja. Opazili smo okužbe s črno nogo. Črna noga se pojavi pred cvetenjem, ko cima začne rumeneti, če jo izruvamo pa opazimo črno propadlo steblo (nogo) v spodnjem delu, ki je v zemlji. Take rastline je potrebno skupaj z gomolji odstraniti iz njive. Črna noga se širi z okuženim semenom in proti njej ni zaščitnega sredstva. Priporočam vsem, da redno spremljate posevke in jih po potrebi zaščitite. Pri izkopu zgodnjega krompirja pazite na karenci!

Pripravila: Anka Poženel, univ.dipl.inž.agr.

FUNGICIDI V KROMPIRJU 2020

KONTAKTNI OZ. DOTIKALNI FUNGICIDI REGISTRIRANI ZA ZAŠČITO PRED KROMPIRJEVO PLESNIJO (*Phytophthora infestans*), 1.6.2020

PRIPRAVEK	AKTIVNA SNOV	ODMEREK	KARENCA	REGISTRIRAN ZA ALTERNARIO*
DITHANE DG Neotec == MANKOZ 75 WG	mankozeb 75%	2 kg/ha	7 dni	DA
DITHANE M-45	mankozeb 80%	2 kg/ha	7 dni	DA
MANFIL PLUS 75 WG, MANFIL 75 WG	mankozeb 75%	2 kg/ha	7 dni	DA
MANFIL 80 WP == PINOZEB M-45	mankozeb 80%	2 kg/ha	7 dni	NE
PENNCOZEB 75 DG	mankozeb 75%	1,7 kg/ha	7 dni	NE
AVATAR 75 NT	mankozeb 75%	2 kg/ha	7 dni	DA
ENERVIN	ametoktradin 12%	2 kg/ha	7 dni	NE

	+ metiram 44%			
POLYRAMDF	metiram 70%	2 kg/ha	21 dni	NE
RANMAN TOP	ciazofamid 16%	0,5 l/ha	7 dni	NE
SHIRLAN 500 SC = WINBY = FROWNCIDE	fluazinam 50%	0,4 l/ha	7 dni	NE

SISTEMIČNI IN POLSISTEMIČNI FUNGICIDI REGISTRIRANI ZA ZAŠČITO PRED KROMPIRJEVO PLESNIJO
(*Phytophthora infestans*), 1.6.2020

PRIPRAVEK	AKTIVNA SNOV	ODMEREK	KARENCA	REGISTRIRAN ZA ALTERNARIO*
ACROBAT MZ WG = FORUM MZ WG	dimetomorf 9% + mankozeb 60%	2 kg/ha	7 dni	DA
ELECTIS 75 WG	mankozebl 66,7% + zoksamid 8,3%	1,5 - 1,8 kg/ha	7 dni	NE
GALBEN M	benalaksil 8% + mankozebl 65%	2,5 kg/ha	28 dni	NE
INFINITO	fluopikolid 6,25 % + propamokarb 62,5 %	1,2 - 1,6 l/ha	7 dni	NE
MOXIMATE 725 WG = MOXIMATE 725 WP = MOXIMATE PLUS = PROFILUX= CURZATE M72,5 WG	cimoksani1 4,5% + mankozeb 68%	2,5 kg/ha	7 dni	NE
CYMBAL	cimoksani1 45%	0,2 – 0,25 kg/ha	7 dni	NE
SACRON 45 DG	cimoksani1 45%	0,22 kg/ha	14 dni	NE
VALIS M	Valifenalat 6% +mankozebl 60 %	2,5	7 dni	
NAUTILE DG	cimoksani1 5% + mankozebl 68%	2 kg/ha	7 dni	NE
NAUTILE WP	cimoksani1 4,5% + mankozeb 65%	2,25 kg/ha	21 dni	NE
EQUATION PRO	cimoksani1 30%	400 g/ha	14 dni	NE

	+ famoksadon 22,5%			
BANJO FORTE	dimetomorf 20% + fluazinam 20%	1 l/ha	7 dni	NE
ORVEGO	ametoktradin 30% + dimetomorf 2,5%	0,8 l/ha	7 dni	NE

**SISTEMIČNI IN POLSISTEMIČNI FUNGICIDI REGISTRIRANI ZA ZAŠČITO PRED
KROMPIRJEVO PLESNIJO (*Phytophthora infestans*), 1.6.2020**

PRIPRAVEK	AKTIVNA SNOV	ODMEREK	KARENCA	REGISTRIRAN ZA ALTERNARIO*
RIDOMIL GOLD MZ PEPITE	mankozeb 64% + metalaksil-M 3,88%	2,5 kg/ha	21 dni	NE
ARMEIL M	Mankozeb 64%+ Metalaksil 8 %	2,5 kg/ha	21 dni	NE
GETT = PERGADO MZ	mandipropamid 5% + mankozeb 60%	2,5 kg/ha	7 dni	DA
REVUS	mandipropamid 25%	0,4 - 0,6 l/ha	3 dni	NE
TANOS 50 WG	cimoksanil 25% + famoksadon 25%	0,7 kg/ha	14 dni	NE
CARIAL FLEX	Cimoksanil 18%+ Mandipropamid 25%	0,6 kg/ha	7 dni	NE
CURZATE PARTNER	Cimoksanil 60%	0,15 kg/ha	1 dan	NE
PROXANIL 450 SC	Cimoksanil 5%+ propamokarb hidroklorid 40%	2-2,5 l/ha	14 dni	NE
REBOOT	Cimoksanil 33%+ zoksamid 33%	0,45 kg/ha	7 dni	NE
RIVAL DUO	Cimoksanil 5%+ Propamokarb hidroklorid 40%	2,5 l/ha	14 dni	NE

COPFORCE EXTRA	baker v obliki bakrovega hidroksida 30%+ cimoksanil 6%	2 kg/ha	14 dni	NE
CURZATE C EXTRA	baker v obliki bakrovega hidroksida 25% + cimoksanil 6%	2 kg/ha	28 dni	NE

KONTAKTNI OZ. DOTIKALNI FUNGICIDI NA OSNOVI BAKRA REGISTRIRANI ZA ZAŠČITO PRED KROMPIRJEVO PLESNIJO (*Phytophthora infestans*), 1.6.2020

PRIPRAVEK	AKTIVNA SNOV	ODMEREK	KARENCA	REGISTRIRAN ZA ALTERNARIO
NORDOX 75 WG	baker v obliki bakrovega oksida 75%	1 kg/ha	14 dni	DA Dovoljen za EKO pridelavo!
CUPRABLAU Z 35 WP	baker v obliki bakrovega oksiklorida 35%	2,8 kg/ha	14 dni	DA Dovoljen za EKO pridelavo!
CUPRABLAU Z 35 WG	baker v obliki bakrovega oksiklorida 35%	2,1 kg/ha	14 dni	DA Dovoljen za EKO pridelavo!
BADGE WG	baker kot bakrov oksiklorid 24,5% baker kot bakrov hidroksid 24,4 %	3 kg/ha	7dni	NE Dovoljen za EKO pridelavo!

*** *Alternaria solani* - črna listna pegavost krompirja**

Pripravi/a: A. Poženel, univ. dipl. inž. agr.; KGZS, KGZ Nova Gorica, Kmetijska svetovalna služba;

Vir: Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 1.6.2020, MKGP, URSVHVVR

Datum objave obvestila: 10.06.2020 09:19

Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Objavil/a: Devetak Marko

Pripravil: **Marko Devetak**

Seznam registriranih FFS

