

50. VARSTVO VINSKE TRTE - 11.06.2020 07:29 - Zaključeno



Fenološki razvoj vinske trte

Na območju vinorodnega pod okoliša Šmarje – Virštanj, Slovenskih Konjic in Spodnje Savinjske doline je vinska trta v povprečju na opazovane lokacije in sorte vstopila v fenološko fazo cvetenja (BBCH 60 - 61). Na izpostavljenih lokacijah sorte, ki so hitrejšje v razvoju (Chardonnay, Modra frankinja) že dosegajo fazo BBCH 63 – 64 (30% do 40 % odprtih cvetnih kapic).

Peronospora in oidij vinske trte

Na opazovanih vinogradniški lokacijah je v odboju med 5. in 11. junijem padalo od 18 mm (Virštanj) do 24,8 mm (Slovenske Konjice) dežja in izpolnjeni so bili zelo dobri pogoji za nove primarne okužbe s peronosporo vinske trte. Ob koncu tedna – ob dvigu temperatur, preglejte vinograde, saj lahko že pričakujete pojav simptomov na listih in kablkih.

V tem času vinska trta bujno raste. Zato pazite na razmike med škropljenji. Ti naj ne bodo daljši od 8 do 10 dni.. Poskrbite, da bo listna masa stalno zaščitena. Škropljenje opravite z enim od kombiniranih, sistemsko ali polsistemsko delujočih pripravki kot so: **Forum star** (1,6 kg/ha), **Sfinga Extra WDG** (1,5 kg/ha), **Forum MZ WG** (2,5 kg/ha), **Acrobat MZ** (2,5 kg/ha), **Orvego** (0,8 L/ha), **Alleato 80 WG** (2,5 kg/ha), **Mikal flash** (4 kg/ha), **Alleato duo** (2-3 kg/ha), **Mikal premium F** (3 kg/ha), **Momentum trio** (3kg/ha) ali **Magma triple WG** (3kg/ha).

V primeru, da od zadnjega škropljenja ni mililo več kot osem dni, lahko opravite škropljenje tudi s pripravki kot so: **Moximate 725 WG**, **Profilux** (1,25 kg/ha), **Nautile DG** (2,4 kg/ha), **Fortuna gold** (1,5 kg/ha), **Sanvino** (0,75 kg/ha), **Fudan gold** (1,5 kg/ha), **Equation pro** (0,4 kg/ha), **Tanos 50 WG** (0,4 kg/ha), **Cymbal** (0,125kg/ha), **Twingo** (3 kg/ha), **Enervin** (2,5 kg/ha), **Reboot** (0,4 kg/ha), **Electis 75 WG** (1,5 – 1,8 kg/ha), **Emendo F** (1,5 kg/ha), **Valis F** (1,5 kg/ha), **Valis M** (2 kg/ha), **Folpan gold** (2 kg/ha), **Ridomil Gold MZ Pepite** (2,5 kg/ha) ali **Armel M** (2,5 kg/ha).

Pripravkom **Alleato 80 WG**, **Equation pro** in **Cymbal** priporočamo dodati polovični odmerek enega od kontaktnih fungicidov.

Uporabite lahko tudi enega od pripravkov kot so: **Mildicut** (2L/ha), **Videryo F** (2,5 L/ha), **Daimyo F** (2,5 L/ha) ali **Vincy F** (2,5 L/ha) ali pripravka na osnovi kalijevaga fosfonata **Sorale LX** oz. **LBG -01F34** (4 L/ha- pri samostojni rabi ali 3 L/ha – pri kombinirani uporabi s fungicidi na osnovi a.s. folpan ali mankozeb). Pri uporabi slednjih prilagodite razmik med škropljenji količini padavin in pazite, da razmik med škropljenji ne bo daljši od 7 dni.

Ob otoplitvi vremena se ustvarjajo tudi pogoji za okužbe z **oidijem vinske trte**. Za preprečevanje okužb priporočamo uporabo enega od naslednjih pripravkov: **Collis** (0,4 L/ha), **Luna Experience** (0,375 L/ha), **Luna max** (1L/ha), **Falcon EC 460** (0,4 L/ha), **Talendo extra** (0,3 L/ha), **Custodia** (0,35 L/ha), **Domark 100 EC** (0,3 L/ha), **Misha 20 EW** (0,23 L/ha), **Systhane 20 EW** (0,14 L/ha), **Karathane Gold 350 EC** (0,5 L/ha), **Kusabi 300 SC** (0,25 L/ha), **Topas 100 EC** (0,3L/ha), **Topaze** (0,3 L/ha), **Score 250 EC** (0,2 L/ha), **Mavita 250 EC** (0,2 L/ha), **Spirox D** (0,5 L/ha), **Sercadis** (0,15 L/ha), **Crystal** (0,16 L/ha), **Unicorn DF** (2,2 kg/ha) ali uporabite pripravke, ki vsebujejo samo aktivno snov tebukonazol kot so: **Folicur EW 250** (0,4 L/ha), **Orius 25 EW** (0,4 L/ha), **Mystic 250 EC** (0,4 L/ha.), **Tebusha 25%EW** (0,4 L/ha), **Baltazar** (0,4 L/ha) ali **Star Tebukonazol** (0,4 L/ha),

Uporabite lahko tudi pripravek **Cabrio Top** (2,0 L/ha), ki deluje tudi na peronosporo vinske trte.

Prav tako lahko dodate pripravke na osnovi močljivega žvepla kot so: **Cosan**, **Kumulus DF**, **Microthiol special**, **Pepelin**, **Thiovit Jet** ali **Vindex 80 WG** - v odmerku 3 do 8 kg/ha ali **Biotip Sulfo 800 SC**, **Pol- Sulphur 80 WG**, **WP**, **Pol- Sulphur 800 SC**, **Symbiotica fito – granulirano žveplo**, **Symbiotica fito – tekoče žveplo** - v odmerku 4L/ha. Ob pojavu okužbe lahko uporabite tudi **Cosinus**, **Cosavet DF** ali **Močljivo žveplo Karsia DF** v odmerku do 8 kg/ha.

Ameriški škržatek

V vinogradih prevladujejo ličinke L1 razvojnega stadija. Prisotne pa so tudi ličinke L2 razvojnega stadija. O rokih zatiranja in uporabi primernih insekticidov vas bomo pravočasno obvestili.

V primeru toče dajte pri škropljenju prednost pripravkom, ki vsebujejo aktivno snov **folpet** kot so: **Forum star**, **Sfinga Extra WDG**, **Folpan gold**, **Valis F**, **Emendo F**, **Videryo F**, **Daimyo F**, **Vincy F**, **Mikal flash**, **Momentum F**, **Alleato duo**, **Mikal premium F**, **Momentum trio** ali **Magma triple WG**

Datum objave obvestila: 11.06.2020 07:29

Obvestilo prognoističnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus

Pripravila: **Alenka Ferlež-Rus**

[Seznam registriranih FFS](#)



MKGP-UVHVR | Izjava o dostopnosti | FITO-INFO | NEOX s.p., 2014 | BRON d.o.o. © 2024