



Osrednja Slovenija - Kmetijski inštitut Slovenije / Ostalo / 60. VARSTVO JABLAN IN HRUŠK

## 60. VARSTVO JABLAN IN HRUŠK - 15.06.2020 11:17 - Zaključeno



Zaključuje se obdobje nevarnosti primarnih okužb z jablanovim škrlupom. V nasadih, kjer pege škrlupa niso prisotne, lahko časovne razmike med posameznimi škropljenji povečate na 10 do 14 dni oziroma prilagodite varstvo vremenskim razmeram. V nasadih, kjer opažate pege škrlupa, pa obstaja nevarnost sekundarnih okužb, zato je potrebno dosledno izvajanje preventivnega varstva za preprečevanje okužb na plodovih. Za škropljenje priporočamo enega izmed pripravkov na osnovi a.s. kaptan kot so **Merpan 80 WDG, Orthocide 80 WG, Scab 80 WG, Scab 480 SC** lahko pa uporabite tudi katerega izmed ostalih dotikalnih pripravkov.

Za varstvo ekoloških nasadov lahko uporabite pripravek **Curatio – žvepleno apnena brozga** ali **Vitisan**.

V primeru pojava neurij s točo, ki bi poškodovala nasade, dajte prednost uporabi pripravkom na osnovi **kaptana** kot so **Merpan 80 WDG, Orthocide 80 WG, Scab 80 WG, Scab 480 SC**.

Za varstvo pred jablanovo pepelovko priporočamo dosledno izrezovanje okuženih poganjkov in dodajanje škropilni brozgi enega izmed **žveplovin pripravkov**. Žveplovi pripravki so dovoljeni tudi v ekološki pridelavi.

### Jabolčni zavijač

V nasadih, kjer je minilo več kot 14 dni od zadnjega škropljenja proti jablanovemu zavijaču, je potrebno ponovno opraviti škropljenje. Za zatiranje škodljivca lahko uporabite enega izmed pripravkov kot so **Coragen, Exirel, Mimic, Runner 240 SC**.V nasadih kjer imate težave tudi s prerazmnožitvijo listnih uši pa lahko uporabite pripravek **Calypso SC 480** ali **Mospilan 20 SG**.

V sadovnjakih, kjer ste imeli v lanskem letu težave z obvladovanjem jabolčnega zavijača, priporočamo dodajanje pripravka **Madex max** ali **Carpovirusine** v polovičnem odmerku. Virusni pripravki fiziološko slabijo gosenice.

Za varstvo ekoloških nasadov lahko uporabite pripravek **Madex max, Carpovirusine** ali **Laser plus**. Slednji poleg jabolčnega zavijača dobro zatira tudi gosenice drugih škodljivih zavijačev. Upoštevajte, da imajo virusni pripravki izpostavljeni soncu kratko življensko dobo, zaradi česar jih je potrebno redno nanašati. Za varstvo pred drugimi škodljivimi gošnicami priporočamo, da škropilni brozgi dodate pripravek na osnovi *Bt*, kot je **Agree, Lepinox plus** ali **Delfin WG**.

**Upoštevajte sredstvom priložena navodila in registracije posameznih pripravkov! Pred škropljenjem pokosite cvetočo podrast!**

Datum objave obvestila: 15.06.2020 11:17

Obvestilo prognostičnega centra: Osrednja Slovenija/Kmetijski inštitut Slovenije

Objavil/a: Novljan Matic

Pripravil: **Matic Novljan, Primož Žigon, Uredila: Meta Zemljič**

Seznam registriranih FFS

