

64. VARSTVO PLODOVK PRED RESARJI - 15.06.2020 11:21 - Zaključeno



Na plodovkah opažamo povečan pojav cvetličnega in tobakovega resarja. Ličinke in odrasli resarji lahko s prehranjevanjem deformirajo liste, cvetove in plodove rastlin. Plodovi lahko dobijo srebrnkaste lise, na katerih pogosto opazimo drobne črne iztrebke. Obe vrsti resarjev sta pomembni prenašalki virusa pegavosti in uvelosti paradižnika (TSWV). Resarje lahko spremljate z modrimi lepljivi ploščami, ki jih postavite v posevek ali pa njihovo prisotnost potrdite s podrobnim pregledom cvetov s pomočjo lupe. Za zatiranje resarjev lahko na plodovkah uporabite

Biotip floral, Botanigard WP, Botanigard OD, Confidor 70 WG, Karate Zeon 5 CS, Kohinor SL 200, Laser plus, Naturalis, Neemazal – T/S, Requiem prime, Sivanto prime, Vertimec pro.

Pred rabo insekticidov pozorno preberite sredstvom priložena navodila! Upoštevajte opozorila za varstvo čebel in okolja!

Datum objave obvestila: 15.06.2020 11:21

Obvestilo prognostičnega centra: Osrednja Slovenija/Kmetijski inštitut Slovenije

Objavil/a: Urbančič Zemljič Meta

Pripravili: **Meta Urbančič Zemljič in Neja Marolt**

[Seznam registriranih FFS](#)

