

72. OBVESTILO O VARSTVU OLJČNIKOV - 16.06.2020 15:36 - Zaključeno



Pavje oko in oljkova siva pegavost

Oljkarje obveščamo, da smo po zadnjih pogostih in obilnejših padavinah v nekaterih oljčnikih opazili povečan pojav bolezni oljk in sicer pavjega očesa in oljkove sive pegavosti. Oljkarjem priporočamo, da v okuženih oljčnikih uporabijo bakrove pripravke, ki delujejo proti obema boleznima. Pri tem lahko uporabijo naslednja sredstva:

AKTIVNA SNOV	FFS	ODMEREK
- bakrov oksiklorid	Cuprablau-Z 35 WG	1.6-2 kg/ha
- bakrov oksiklorid	Cuprablau-Z 35 WP	2 kg/ha
- bakrov oksid	Nordox 75 WG	1,25 kg/ha

Uporaba omenjenih pripravkov je dovoljena tudi pri ekološki pridelavi oljk.

Glavni znaki **pavjega očesa** so okrogle sive pege na listih in močno odpadanje listov v spodnjem delu krošnje. Na bolezen sta posebno občutljivi Istrska belica in Oblica.

Glavni znaki **oljkove sive pegavosti** so blaga sajavost na spodnji strani in rumenenje zgornje strani lista. Na bolezen so posebno občutljive italijanske sorte (Leccino, Lecone in Pendolino).

Uporabo bakrovih pripravkov priporočamo tudi v primeru nastanka poškodb zaradi neurij in toče, saj razkužijo nastale rane in ovirajo razvoj bakterije, povzročiteljice **oljkovega raka**.

Bodite pozorni na karenco pripravkov! Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

Oljčni molj

Oljkarje obveščamo, da na feromonskih vabah opažamo prisotnost metuljčkov plodovega rodu oljčnega molja.

Samice plodove generacije odlagajo jajčeca na plodiče oljk v območju peclja. Izlegla ličinka se zavrta v še neolesenelo koščico ploda. Poškodovani plodovi pričnejo odpadati z drevesa v prvi polovici septembra. Vrh odpadanja plodov je navadno dosežen sredi septembra, ko oljčni molj pri peclju zpušča koščice oljk. Največ škode oljčni molj naredi na naši najpomembnejši in najštevilčnejše zastopani sorti 'Istrski belici'.

Oljkarjem katerim oljčni molj redno povzroča večji izpad pridelka, lahko sedaj proti plodovemu (karpofagnem) rodu oljčnega molja v sklopu integrirane pridelave uporabijo pripravek na osnovi spinetorama **DELEGATE 250 WG** v odmerku 0,075 kg/ha. Karenca sredstva je 21 dni. Pripravek je nevaren za čebele!

Bodite pozorni na karenco pripravkov! Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

Oljčna muha

Po 15. juniju smo pričeli s spremljanjem pojava oljčne muhe s pomočjo feromonskih vab. Na območju Slovenske Istre oljčno muho spremljamo na 15. lokacijah, na območju Goriških Brd na štirih, na območju Vipavske doline v sedmih oljčnikih in na Goriškem Krasu na eni lokaciji.

Natančne podatki o ulovu muhe v omenjenih oljčnikih lahko preverite na naslovu www.kmetijskizavod-ng.si

Oljkarjem priporočamo, da tudi sami v svojih oljčnikih namestijo feromonske vabe ali rumene lepljive plošče za spremljanje pojava najpomembnejše škodljivke oljk. Vabe postavimo na južni oziroma zavetrni del krošnje oljke v višini glave. Na 1 ha namestimo eno do tri vabe. Veliko bolj selektivne so feromonske vabe, saj se na njih v glavnem lovijo le oljčne muhe, medtem ko se na rumenih lepljivih ploščah lovijo tudi druge žuželke, med katerimi je veliko koristnih. Nameščanje velikega števila rumenih plošč je tako lahko bolj škodljivo kot koristno.

Pripravil: Matjaž Jančar

Datum objave obvestila: 16.06.2020 15:36

Obvestilo prognoističnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Objavil/a: JANČAR Matjaž

Pripravil: **Matjaž Jančar**, tel.: 05 630 40 60

[Seznam registriranih FFS](#)

