



77. OBVESTILO O VARSTVU KAPUSNIC - 29.06.2020 08:56 - Zaključeno



V drugi polovici meseca avgusta ugotavljamo povečan nalet metuljčkov sovk, predvsem njivske in ozimne. Pridelovalcem kapusnic priporočamo, da pregledajo posevke na prisotnost gosenic. V primeru prerazmnožitve omenjenih škodljivcev in preseženega praga škodljivosti (1 gosenica / rastlino) lahko uporabite sledeče insekticide:

aktivna snov	pripravek	odmerek	karenca	Registriran za: Opombe:
lambda - cihalotrin	Karate zeon 5 CS	0,2 L/ha	3 dni za redkvico, 7 dni za kitajsko zelje, 21 dni za zelje in brstični ohrovt	Zelje, brstični ohrovt in redkvica; za manjše uporabe v kitajskem zelju in cvetači. Uporaba ob pojavu škodljivih žuželk. Sredstvo se lahko uporabi največ dvakrat v eni rastni sezoni. Sredstvo je nevarno za čebele. Z njim se ne sme tretirati rastlin med cvetenjem.
tebufenozid	Mimic	0,3 - 0,4 L/ha	14 dni	Kapusnice. Škropi se enkrat letno v času, ko se pričnejo izlegati gosenice, višji odmerki pa so namenjeni za uporabo po končanem izleganju gosenic.
indoksakarb	Steward	85 g/ha	3 dni	Zelju, cvetači, brstičnem ohrovu, rdečem zelju in brokoliju. Tretirati se začne med fazo izleganja jajčec ali na začetku razvoja ličink. V eni rastni dobi se ga uporablja največ trikrat v razmiku 7 dni.
emamektin	Affirm	1,5 kg/ha	3 dni	Zelje, brokoli in cvetača na prostem. Tretira se od fenološke faze začetka oblikovanja glavic do 3 dni pred pobiranjem pridelka (BBCH 41-49). Prvo tretiranje se izvede takoj, ko se izležejo prve gosenice in še preden se te zarijejo v glavice. Tretiranje se po potrebi ponavlja v tedenskih razmkih. Sredstvo se sme na istem zemljišču uporabiti največ trikrat v eni rastni dobi.
azadirahthin A	Neemazal - T/S	3,0 L/ha	3 dni	Na zelju, ohrovu in brstičnem ohrovu na prostem. Tretiramo ob pojavu prvih škodljivcev, tretiranje po potrebi čez 7 – 14 dni ponovimo; uporabljamo ga največ 2 krat v eni rastni dobi.
beta-ciflutrin	Bulldock EC 25	0,3 - 0,5 L/ha	7 dni	V glavnatem zelju, kitajskem zelju in ohrovu. Sredstvo se na istem zemljišču lahko uporabi

				največ dvakrat v eni rastni sezoni.
lambda-cihalotrin	Karis 10 CS	0,05 L/ha	21 dni za zelje in brstični ohrovt, 10 dni za listnati ohrovt in brokoli, 7 dni za cvetačo	V brstičnem ohrovtu, zelju, cvetači, ohrovtu in brokoliju (vključno s sorto calabrese). Tretira se, ko je prag škodljivosti presežen. V eni rastni sezoni se ga lahko na istem zemljišču uporabi 2 krat v 10 dnevnem časovnem intervalu.
<i>Bacillus Thuringiensis</i> <i>Var. Aizawai</i>	Agree WG	1 kg/ha	Ni potrebna	Kapusnice. Prvo tretiranje se opravi, ko se izležejo prve ličinke škodljivih metuljev (od BBCH 09). S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ tri krat v eni rastni dobi, v časovnem intervalu 7 dni.
klorantraniliprol	Coragen Prepovedan na WOI in območjih NUV za vključene v KOPOP	125 mL/ha, ob porabi vode 300 - 800 L/ha	1 dan	Za cvetačo, brokoli, glavno zelje in ohrovt. Tretira se od fenološke faze razgmenenega drugega lista do konca rasti (BBCH 12 do 49), ob upoštevanju karence. V cvetači, brokoliju, glavnem zelju in ohrovtu sta dovoljeni dve tretiranji v eni rastni sezoni v intervalu, ki ne sme biti krajši od 14 dni. Tretira se v času izleganja jajčec oziroma takoj, ko se iz jajčec začnejo izlegati prve ličinke

Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo, zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda I. in II. reda. V primeru uporabe sredstev, nevarnih za čebele, je potrebno cvetočo podrast pokositi in škropljenje opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih.

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN

Datum objave obvestila: 29.06.2020 08:56

Obvestilo prognostičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor

Objavil/a: MIKLAVC Jože

Pripravil: **Jože Miklavc**

Seznam registriranih FFS



MKGP-UVHVR | Izjava o dostopnosti | FITO-INFO | NEOX s.p., 2014 | BRON d.o.o. © 2024