



Napovedi za vso Slovenijo - Kmetijski inštitut Slovenije / Krompir / 85. VARSTVO KROMPIRJA

85. VARSTVO KROMPIRJA - 29.06.2020 11:12 - Zaključeno



Nasade krompirja je potrebno še naprej varovati pred krompirjevo plesnijo in obnavljati škropilno oblogo. Posebna skrb je potrebna na njivah, kjer se je bolezen že pojavila. Priporočamo rabe fungicidov z delnim sistemičnim oz. translaminarnim delovanjem kot so pripravki z dimetomorfom (**Acrobat MZ WG, Forum MZ WG, Banjo fort**), mandipropamidom (**Pergado MZ, Gett, Revus**), cimoksanihom (**Carial flex, Curzate M, Curzate C extra Equation pro, Moximate, Nautile, Profilux, Reboo, Tanos 50 WG** in drugi) ali valifenalatom (**Valis M**). Uporabite lahko tudi fungicide z dotikalnim delovanjem na osnovi mankozeba (**Avtar, Dithane, Manfil, Pinozel** in podobni, **Electis 75 WG**) ali **Polyram DF**. V ekoloških nasadih uporabite katerega od bakrovih pripravkov. Dotikalni fungicidi se hitreje izpirajo, zato je potrebno škropilno oblogo obnavljati po vsakem obilnejšem dežju oz. na en teden. **Pri izbiri sredstev upoštevajte priporočila glede dovoljenega števila rab!**

Sedanje razmere so ugodne tudi za razvoj črne listne pegavosti. Bolezen zatirajo sredstva proti krompirjevi plesni, ki vsebujejo aktivno snov mankozeb. Od prej navedenih so to **Acrobat, Forum, Nautile, Moximate, Gett, Pergado MZ, Valis M** ter našteti dotikalni fungicidi z mankozebom. Za zadovoljiv učinek proti črni listni pegavosti mora biti aktivna snov mankozeb uporabljena v odmerku 1500 g/ha, zato je potrebno fungicidom z manjšim deležem te snovi dodajati katerega od pripravkov, ki vsebujejo samo mankozeb (**Dithane, Mankoz, Manfil, Pinozel**), da se doseže želena skupna količina aktivne snovi. Samo črno listno pegavost lahko zatirate tudi s sredstvi na osnovi azoksistrobina (**Chamane, Ortiva, Mirador 250 SC, Tazer, Zafra azt 250**) ali difenokonazola (**Difcor 250 EC, Mavita 250 EC, Score 250 EC, Sercadis plus**). Ti pripravki ne zatirajo krompirjeve plesni.

V nasadih spremljajte tudi razvoj koloradskega hrošča. Za zatiranje ličink lahko uporabite katerega od pripravkov kot so **Alverde, Biscaya, Bulldock EC 25, Calypso SC 480, Coragen, Mavrik 240, Mospilan 20 SG** podobni. Ekološki pridelovalci lahko uporabite **Raptol koncentrat, Laser plus** ali **Neemazal-T/S**.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila!

Datum objave obvestila: 29.06.2020 11:12

Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije

Objavil/a: Urbančič Zemlič Meta

Pripravili: **Meta Urbančič Zemlič in Neja Marolt**

Seznam registriranih FFS



MKGP-UVHVR | Izjava o dostopnosti | FITO-INFO | NEOX s.p., 2014 | BRON d.o.o. © 2024