

86. OBVESTILO O VARSTVU HRUŠK IN JABLAN - 03.07.2020 14:27 - Zaključeno



Škrlup

Nadaljujte z izvajanjem rednih škropljenj proti škrlupu. Priporočeni razmiki med škropljenji so v tem času 10 – 14 dni, prilagoditi jih je potrebno vremenskim razmeram in zdravstvenemu stanju nasadov. Škropljenje je potrebno ponoviti, če pade več kot 20 do 30 mm padavin. V tem času svetujemo uporabo kontaktnih fungicidov na osnovi aktivne snovi kaptan oz.

pripravkov: **Merpan 80 WDG**, **Orthocide 80 WG**, **Scab 80 WG** ali **Scab 480 SC**. Uporabo naštetih pripravkov svetujemo v tudi primeru neurij s sodro ali točo, ker preprečujejo gnitje plodov.

Jabolčni zavijač

V minulem tednu smo na nekaterih lokacijah v Brkinih (Prelože, Čelje) ter na Tolminskem (Volče), zabeležili visoke ulove jabolčnega zavijača. V Vipavski dolini in večjem delu Brkinov so ulovi zavijača pod pragom škodljivosti. Škropljenje proti jabolčnemu zavijaču svetujemo samo na lokacijah, kjer je presežen prag škodljivosti (10 metuljkov/feromonsko vabo/teden) in je od zadnjega škropljenja minilo več kot 14 dni.

Za zatiranje jabolčnega zavijača so registrirani naslednji insekticidi:

Fitofarmacevtsko sredstvo	Aktivna snov	Odmerek / konc.	OPOMBE:
Affirm	emamektin	1 kg/ha/m višne krošnje max. 4,0 kg/ha	
Afirm opti	emamektin	2,0 kg/ha	
Calypso SC 480	tiakloprid	0,3 L/ha	Dobro deluje na ličinke marmorirane smrdljivke (<i>Halyomorpha halys</i>)
Coragen	klorantraniliprol	0,27 L/ha	
Delegate 250 WG	spinoateram	0,3 kg/ha	
Exirel	ciantraniliprol	0,9 L/ha	
Harpun	piroproksifen	1,0 L/ha	
Insegar 25 WG	fenoksikarb	0,6 kg/ha	Deluje tudi na ličinke ameriškega kaparja (<i>Quadraspidiotus perniciosus</i>)
Imidan 50 WG	fosmet	1 kg/ha	Delno učinkovito deluje na ličinke marmorirane smrdljivke (<i>Halyomorpha halys</i>)
Laser plus	spinosad	0,3 L/ha	
Mimic	tebufenozid	0,9 – 1,0 L/ha	
Mospilan 20 SG	acetamiprid	0,05 % Max. 0,5 kg/ha	Dobro deluje na ličinke in odrasle osebe marmorirane smrdljivke (<i>Halyomorpha halys</i>)
Runner 240 SC	metoksifenoizid	0,45 L/ha	

Steward	indoksakarb	0,017 % oz. 225 g/ha	Dobro deluje na ličinke marmorirane smrdljivke (<i>Halyomorpha halys</i>)
---------	-------------	----------------------	---

Poleg zgoraj naštetih sredstev lahko za zatiranje jabolčnega zavijača uporabite tudi pripravke: **Agree WG** v odmerku 1 kg/ha, **Lepinox plus** v odmerku 1 kg/ha, **Carpovirusine** v odmerku 1L/ha ali **Madex Max** v odmerku 0,05 L/ha/1 m višine krošnje. Našteti pripravki spadajo v skupino biotičnih sredstev oz. bioloških insekticidov, katerih uporaba je dovoljena tudi v ekološki pridelavi sadja. Ker imajo krajše delovanje in so podvrženi hitremu razpadu, je potrebno škropljenje opraviti v večernem času. V primeru padavin oz. močnega sončnega obsevanja, je priporočljivo škropljenje ponoviti.

Marmorirana smrdljivka

V nasadih breskev in nektarin ter jablan in hrušk v Vipavski dolini, Goriških Brdih In Slovenski Istri še vedno opazamo povečan pojav marmorirane smrdljivke. Poleg odraslih stenic, ki v tem času še odlagajo jajčeca, opazamo tudi pojav ličink (nimf) 2 - 4 razvojne stopnje. Odrasle stenice in ličinke se prehranjujejo na listih, poganjkih in mladih plodičih. Z vbadanjem v rastlinsko tkivo povzročajo nepravilnosti v razvoju plodov, iznakaženost, smoljenje in gnitje plodov. Posledica prehranjevanja na zrelih plodovih so razbarvanja kože, udrte pege in grenko meso. V nasadih kjer opazate velik pojav ličink marmorirane smrdljivke in poškodbe na plodovih, svetujemo uporabo za ta namen registriranih insekticidov.

Fitofarmacevtsko sredstvo	Odmerek / konc.	Kultura	OPOMBE
Mospilan 20 SG	0,05 % Max. 0,5 kg/ha	sliva, jablana, hruška, breskev, nektarina, marelica	Na istem zemljišču dovoljeni največ 2 tretiranja letno
Karate Zeon 5 CS	0,018 %	hruška	Na istem zemljišču dovoljeni največ 2 tretiranja letno
Decis 2,5 EC*	0,5 L/ha	sliva, jablana, hruška, b r e s k e v , marelica, oreh, leska	* Izdano dovoljenje za nujne primere v zvezi z varstvom rastlin za obdobje 28.05.2020 do 27.09.2020 ** Na istem zemljišču dovoljeni največ 2 tretiranja letno *** Upoštevati 50 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda.
Aset Five	0,064 %	pečkate in koščičaste sadne vrste, jagodičevje, agrumi, leska, aktinidija, kaki, smokva	* Izdano dovoljenje za nujne primere v zvezi z varstvom rastlin za obdobje 15.06.2020 do 14.10.2020+ ** Na istem zemljišču dovoljena največ 3 tretiranja letno *** sredstvo se lahko uporablja tudi v ekološki pridelavi sadja

Pri uporabi čebelar nevarnih sredstev, je potrebno odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

Hrušev ožig

Z namenom zgodnjega odkrivanja znakov morebitnih okužb s hruševim ožigom priporočamo, da redno pregledujete sadovnjake jablan in hrušk in sadne vrtove, ter da v primeru suma na ožig obvestite fitosanitarno inšpekcijo ali službo za varstvo rastlin na Kmetijsko-gozdarskem zavodu v Novi Gorici (tel. 3351200).

Datum objave obvestila: 03.07.2020 14:27

Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Objavil/a: ROT Mojca

Pripravila: **Mojca Rot**

