

88. OBVESTILO O VARSTVU HRUŠK IN JABLAN - 10.07.2020 13:14 - Zaključeno



Jabolčni zavijač

V minulem tednu smo na nekaterih lokacijah v Brkinih (Beka, Zavrhek in Prelože) zabeležili visoke ulove jabolčnega zavijača. Škropljenje proti jabolčnemu zavijaču svetujemo samo na lokacijah, kjer je presežen prag škodljivosti (10 metuljčkov/feromonsko vabo/teden) in je od zadnjega škropljenja minilo več kot 14 dni.

Za zatiranje jabolčnega zavijača so registrirani naslednji insekticidi:

Fitofarmacevtsko sredstvo	Aktivna snov	Odmerek / konc.	OPOMBE:
Affirm	emamektin	1 kg/ha/m višne krošnje max. 4,0 kg/ha	
Afirm opti	emamektin	2,0 kg/ha	
Calypso SC 480	tiakloprid	0,3 L/ha	Dobro deluje na ličinke marmorirane smrdljivke (Halyomorpha halys)
Coragen	klorantraniliprol	0,27 L/ha	
Delegate 250 WG	spinoteram	0,3 kg/ha	
Exirel	ciantraniliprol	0,9 L/ha	
Harpun	piroproksifen	1,0 L/ha	
Insegar 25 WG	fenoksikarb	0,6 kg/ha	Deluje tudi na ličinke ameriškega kaparja (Quadraspidiotus perniciosus)
Imidan 50 WG	fosmet	1 kg/ha	Delno učinkovito deluje na ličinke marmorirane smrdljivke (Halyomorpha halys)
Laser plus	spinosad	0,3 L/ha	
Mimic	tebufenozid	0,9 – 1,0 L/ha	
Mospilan 20 SG	acetamiprid	0,05 % Max. 0,5 kg/ha	Dobro deluje na ličinke in odrasle osebkke marmorirane smrdljivke (Halyomorpha halys)
Runner 240 SC	metoksifenoizid	0,45 L/ha	
Steward	indoksakarb	0,017 % oz. 225 g/ha	Dobro deluje na ličinke marmorirane smrdljivke (Halyomorpha halys)

Poleg zgoraj naštetih sredstev lahko za zatiranje jabolčnega zavijača uporabite tudi pripravke: **Agree WG** v odmerku 1 kg/ha, **Lepinox plus** v odmerku 1 kg/ha, **Carpovirusine** v odmerku 1L/ha ali **Madex Max** v odmerku 0,05 L/ha/1 m višine krošnje. Našteti pripravki spadajo v skupino biotičnih sredstev oz. bioloških insekticidov, katerih uporaba je dovoljena tudi v ekološki pridelavi sadja. Ker imajo krajše delovanje in so

podvrženi hitremu razpadu, je potrebno škropljenje opraviti v večernem času. V primeru padavin oz. močnega sončnega obsevanja, je priporočljivo škropljenje ponoviti.

Hrušev ožig

Z namenom zgodnjega odkrivanja znakov morebitnih okužb s hruševim ožigom priporočamo, da redno pregledujete sadovnjake jablan in hrušk in sadne vrtove, ter da v primeru suma na ožig obvestite fitosanitarno inšpekcijo ali službo za varstvo rastlin na Kmetijsko-gozdarskem zavodu v Novi Gorici (tel. 3351200).

Datum objave obvestila: 10.07.2020 13:14

Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Objavil/a: ROT Mojca

Pripravila: **Mojca Rot**

[Seznam registriranih FFS](#)

