

69. AMERIŠKI ŠKRŽATEK - 17.07.2020 10:36 - Zaključeno



Drugo zatiranje ameriškega škržatka

Pri spremljanju razvoja **ameriškega škržatka** prevladujejo ličinke L₃, L₄ in L₅ razvojnega stadija, še vedno pa najdemo tudi ličinke L₂ razvojnega stadija. Odraslih osebkov na rumenih lepljivih ploščah še nismo zabeležili **V zadnji dekadi meseca julija** v vinogradih za pridelavo grozdja ter na brajdah oziroma ohišnicah v žariščih okužbe in njihovih varovalnih pasovih, ki obsegajo celotno območje vinorodnega pod okoliša Šmarje – Virštanj in ožji okoliš Slovenske Konjice, **opravite drugo škropljenje v primeru, če boste na rumene lepljive plošče ulovili 4 in več odraslih osebkov ameriškega škržatka na teden**. Zato še posebej pozorno spremljajte ulove odraslih osebkov na rumenih lepljivih ploščah in ob preseganju praga škodljivosti opravite drugo škropljenje.

V kolikor ste prvo škropljenje proti ameriškemu škržatku opravili s pripravkoma Mospilan 20 SG ali Sivanto prime in ne boste beležili odraslih osebkov na rumenih lepljivih ploščah, drugo škropljenje ni obvezno. V kolikor pa ste za prvo škropljenje uporabili katero drugo registrirano sredstvo za zatiranje ameriškega škržatka, pa je potrebno opraviti tudi drugo škropljenje.

V primeru, da ste prvo škropljenje proti ameriškemu škržatku opravili s pripravkom Mospilan 20 SG in boste beležili na rumenih lepljivih ploščah odrasle osebe ameriškega škržatka, pa opravite škropljenje v drugem napovednem roku in dajte prednost pripravku **Sivanto prime**. Uporabite lahko tudi pripravek **Exirel**.

V ekološki pridelavi je treba proti ameriškemu škržatku opraviti 2 do 3 škropljenja. Tretjega škropljenja ni potrebno opraviti, če imetnik po drugem škropljenju s spremljanjem ulova z rumenimi lepljivimi ploščami ugotovi, da so bili ulovljeni manj kot 4 odrasli škržatki na rumeno lepljivo ploščo na teden. V ekološki pridelavi sta dovoljena priprava na osnovi piretrina **Flora verde** in **Biotip floral**.

V matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah sta povsod po Sloveniji obvezni najmanj dve škropljenji ameriškega škržatka, obenem pa morate imetniki spremljati ulove odraslih osebkov z rumenimi lepljivimi ploščami. Če se po drugem škropljenju na rumene lepljive plošče še ulovijo odrasli škržatki, je potrebno opraviti tudi tretje škropljenje.

V matičnih vinogradih lahko uporabite enega od pripravkov kot so: **Sivanto prime, Decis 2,5 EC** – s tem pripravkom zatrete tudi grozne sukače ali **Movento SC 100**, ki zatira tudi trtno uš.

V trsnicah in matičnjakih pa je dovoljena uporaba pripravkov **Mospilan 20 SG, Sivanto prime, Movento SC 100** ali **Decis 2,5 EC**. Pri tem upoštevajte, da se lahko v matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah pripravek Decis 2,5 EC in Movento SC 100 uporabita 2-krat v rastni dobi, ostali pripravki pa 1-krat.

Izven razmejenih območij zatiranje ameriškega škržatka v vinogradih za pridelavo grozdja ni obvezno, je pa **priporočljivo opraviti vsaj eno škropljenje, če je ameriški škržatek v njih navzoč, oziroma če je populacija velika**. V takih vinogradih je priporočljivo spremljati ulov ameriškega škržatka z rumenimi lepljivimi ploščami.

OPOZORILO: Vsa sredstva, ki jih uporabljamo za zatiranje ameriškega škržatka so nevarna za čebele. Škropljenje opravite v poznih večernih ali zgodnjih jutranjih urah (dve uri po sončnem zahodu do dve uri pred sončnim vzhodom), ko so čebele v panjih in ne letijo. Pred škropljenjem odstranite cvetočo podrast. Vsa fitofarmacevtska sredstva je potrebno uporabljati v skladu z navodili za uporabo in navedbami na etiketi ter upoštevati Pravilnik o pravilni uporabi fitofarmacevtskih sredstev (Uradni list RS, št. 71/14 in 28/18).

Preglednica 1: Registrirana fitofarmacevtska sredstva za zatiranje ameriškega škržatka in povzetki omejitev njihove uporabe

Pripravek	Aktivna snov	Odmerek/ koncentracija	Število dovoljenih tretiranj/leto	Karenca (št. dni)	Datum veljavnosti
Mospilan 20 SG ¹	acetamiprid	0,375 kg/ha	eno	42	1.5.- 31.8.2020
Sivanto prime	flupiradifuron	0,5 l/ha	eno	14	9.12.2025
Movento SC 100 ²	spirotetramat	0,7 l/ha	dve	14	30.4.2025
Decis 2,5 EC ⁵	deltametrin	0,5 l/ha	eno ³	14	31.10.2021

			dve ⁴		
Exirel	ciantraniliprol	0,9 l/ha	dve	10	14.9.2027
Steward	indoksakarb	150 g/ha	dve	10	31.12.2020
Flora verde	piretrin	1,6 l/ha	tri	3	13. 8. 2023
Biotip floral	piretrin	1,6 l/ha	tri	3	13. 8. 2023

¹ **Mospilan 20 SG ima v letu 2020 dovoljenje za nujne primere** za zatiranje ameriškega škrtatka v vinogradih za pridelavo vinskega in namiznega grozdja, v matičnih vinogradih, trsnicah in matičnjakih

² **tretiranje samo v matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah**

³ v vinogradih za pridelavo grozdja eno tretiranje – Decis 2,5 EC

⁴ v matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah dve tretiranji - Decis 2,5 EC

⁵ s pripravkoma Decis 2,5 EC in se zaradi zaščite čebel in drugih žuželk opraševalcev lahko tretira le po cvetenju, v nočnem času dve uri po sončnem zahodu in največ dve uri pred sončnim vzhodom

Datum objave obvestila: 17.07.2020 10:36

Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus

Pripravila: **Alenka Ferlež-Rus**

[Seznam registriranih FFS](#)

