

93. OBVESTILO O VARSTVU HRUŠK IN JABLAN - 17.07.2020 12:41 - Zaključeno



Jabolčni zavijač (*Cydia pomonella*)

V minulem tednu smo beležili povečan ulov jabolčnega zavijača v Slovenski Istri (Vaganel) in na Tolminskem (Sužid). V ostalem delu Primorske so ulovi jabolčnega zavijača pod pragom škodljivosti. Škropljenje proti jabolčnemu zavijaču svetujemo samo na lokacijah, kjer je presežen prag škodljivosti (10 metuljčkov/feromonsko vabo/teden) in je od zadnjega škropljenja minilo več kot 14 dni.

Za zatiranje jabolčnega zavijača so registrirani naslednji insekticidi:

Fitofarmacevtsko sredstvo	Aktivna snov	Odmerek / konc.	Karenca (dni)	OPOMBE:
Affirm	emamektin	1 kg/ha/m višne krošnje max. 4,0 kg/ha	7	
Afirm opti	emamektin	2,0 kg/ha	7	
Calypso SC 480	tiaklopid	0,3 L/ha	14	Dobro deluje na ličinke marmorirane smrdljivke (<i>Halyomorpha halys</i>)
Coragen	klorantraniliprol	0,27 L/ha	14	
Delegate 250 WG	spinoteram	0,3 kg/ha	7	
Exirel	ciantraniliprol	0,9 L/ha	7	
Harpun	piroproksifen	1,0 L/ha	zagotovljena s časom uporabe	Uporaba do BBCH 74
Insegar 25 WG	fenoksikarb	0,6 kg/ha	14	Deluje tudi na ličinke ameriškega kaparja (<i>Quadraspidiotus perniciosus</i>)
Imidan 50 WG	fosmet	1 kg/ha	49	Delno učinkovito deluje na ličinke marmorirane smrdljivke (<i>Halyomorpha halys</i>)
Laser plus	spinosad	0,3 L/ha	7	
Mimic	tebufenozid	0,9 – 1,0 L/ha	14	
Mospilan 20 SG	acetamiprid	0,05 % Max. 0,5 kg/ha	14	Dobro deluje na ličinke in odrasle osebkne marmorirane smrdljivke (<i>Halyomorpha halys</i>)
Runner 240 SC	metoksifenzid	0,45 L/ha	14	
Steward	indoksakarb	0,017 % oz. 225 g/ha	7	Dobro deluje na ličinke marmorirane smrdljivke

Poleg zgoraj naštetih sredstev lahko za zatiranje jabolčnega zavijača uporabite tudi pripravke: **Agree WG** v odmerku 1 kg/ha, **Lepinox plus** v odmerku 1 kg/ha, **Carpovirusine** v odmerku 1L/ha ali **Madex Max** v odmerku 0,05 L/ha/1 m višine krošnje. Našteti pripravki spadajo v skupino biotičnih sredstev oz. bioloških insekticidov, katerih uporaba je dovoljena tudi v ekološki pridelavi sadja. Ker imajo krajše delovanje in so podvrženi hitremu razpadu, je potrebno škropljenje opraviti v večernem času. V primeru padavin oz. močnega sončnega obsevanja, je priporočljivo škropljenje ponoviti.

Marmorirana smrdljivka (*Halyomorpha halys*)

Na podlagi dosedanjega spremljanja velikosti populacije marmorirane smrdljivke ter škode na plodovih gostiteljskih rastlin ugotavljamo, da sta ti v letošnjem letu manjši v primerjavi z letom 2019. Trenutno v nasadih beležimo prisotnost manjšega števila ličink 2-5 razvojne stopnje ter posamezne odrasle stenice. Stenice prezimnega rodu so povečini prenehale z odlaganjem jajčec, začenjajo se pojavljati odrasli osebk poletnega rodu, ki se dopolnilno hranijo na plodovih sadnih rastlin ter pariyo. V večjem delu Primorske so v tem obdobju ulovi marmorirane smrdljivke na feromonskih vabah majhni, zato ukrepanje proti škodljivki ni potrebno. Svetujemo, da še naprej redno spremljate stanje v vaših nasadih ter se na podlagi ugotovljene povečane populacije škodljivca, odločate za uporabo fitofarmacevtskih sredstev, ki so v tem letu registrirani za zmanjševanje populacije škodljivca.

Fitofarmacevtsko sredstvo	Odmerek / konc.	Kultura	OPOMBE
Mospilan 20 SG	0,05 % Max. 0,5 kg/ha	sliva, jablana, hruška, breskev, nektarina, marelica	Na istem zemljišču dovoljeni največ 2 tretiranja letno
Karate Zeon 5 CS	0,018 %	hruška	Na istem zemljišču dovoljeni največ 2 tretiranja letno
Decis 2,5 EC*	0,5 L/ha	sliva, jablana, hruška, b r e s k e v , marelica, oreh, leska	* Izdano dovoljenje za nujne primere v zvezi z varstvom rastlin za obdobje 28.05.2020 do 27.09.2020 ** Na istem zemljišču dovoljeni največ 2 tretiranja letno *** Upoštevati 50 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda.
Aset Five	0,064 %	pečkate in koščičaste sadne vrste, jagodičevje, agrumi, leska, aktinidija, kaki, smokva	* Izdano dovoljenje za nujne primere v zvezi z varstvom rastlin za obdobje 15.06.2020 do 14.10.2020+ ** Na istem zemljišču dovoljena največ 3 tretiranja letno *** sredstvo se lahko uporablja tudi v ekološki pridelavi sadja

Hrušev ožig

Z namenom zgodnjega odkrivanja znakov morebitnih okužb s hruševim ožigom priporočamo, da redno pregledujete sadovnjake jablan in hrušk in sadne vrtove, ter da v primeru suma na ožig obvestite fitosanitarno inšpekcijo ali službo za varstvo rastlin na Kmetijsko-gozdarskem zavodu v Novi Gorici (tel. 3351200).

Datum objave obvestila: 17.07.2020 12:41

Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Objavil/a: ROT Mojca

Pripravila: **Mojca Rot**

Seznam registriranih FFS



