



85. VARSTVO VINSKE TRTE - 06.08.2020 14:53 - Zaključeno



Vinska trta pričenja z zorenjem; jagode začene s sortno značilnim barvanjem (79 – 81 po lestvici BBCH). Posameznim ranim sortam se jagode tudi že mehčajo.

S prehodom v zorenje in s tem zaključna tretiranja vinogradov pred **peronosporo vinske trte** svetujemo dotikalno delujoče pripravke na osnovi aktivnih snovi folpet, mankozeb ali baker: FOLLOW 80 WG (1,25 kg/ha; do mehčanja jagod), FOLPAN 80 WDG (1,9 kg/ha), SOLOFOL (1,6 kg/ha; do 79 po BBCH), DITHANE DG NEOTEC (2 kg/ha; do mehčanja jagod), DITHANE M-45 (2 kg/ha; do mehčanja jagod), AVTAR 75 NT (2 kg/ha; do mehčanja jagod), MANFIL 75 WG (2 kg/ha; do 79 po BBCH), MANFIL 80 WP (2 kg/ha; do 79 po BBCH), MANFIL PLUS 75 WG (2 kg/ha; do mehčanja jagod), BADGE WG (2,5 kg/ha; do obarvanja jagod), CUPRABLAU Z 35 WG (3 kg/ha), CUPRABLAU Z 35 WP (3 kg/ha), CUPRABLAU Z 50 WP (2 kg/ha), CUPRABLAU Z ULTRA WP (1,8 kg/ha), CUPROXAT (5,3 l/ha; do začetka zorenja), KOCIDE 2000 (2 kg/ha), NORDOX 75 WG (1,6 kg/ha; do začetka zorenja).

Za varstvo pred **oidijem vinske trte** pridejo v poštev: **BALTAZAR** (0,4 l/ha), **COLLIS** (0,4 l/ha), **NATIVO 75 WG** (0,16 kg/ha; do začetka barvanja), **FALCON EC 460** (0,4 l/ha; do začetka zorenja), **KARATHANE GOLD 350 EC** (0,6 l/ha; do začetka zorenja), **ORIU 25 EW** (0,4 l/ha), **KUSABI 300 SC** (0,3 l/ha; do začetka zorenja), **MISHA20 EW** (0,23 l/ha; do začetka zorenja), **SERCADIS** (0,15 l/ha; do začetka barvanja), **TALENDO** (0,25 l/ha), **PROSPER CS 300** (1 l/ha; do mehčanja jagod), **MAVITA 250 EC** (0,2 l/ha; do mehčanja jagod), **CUSTODIA** (0,525 l/ha; do začetka zorenja), **DOMARK 100 EC** (0,3 l/ha; do začetka zorenja), **STAR TEBUKONAZOL** (0,4 l/ha), **UNICORN DF** (2,2 kg/ha; do začetka zorenja), **DYNALI** (0,65 l/ha; do 87 po BBCH),... Uporabite lahko še **PRIPRAVE NA OSNOVI ŽVEPLA**. Sredstva **VITISAN** (9 kg/ha), **SONATA** (5 l/ha) in **AQ-10** (35 g/ha) so možna za uporabo tudi v ekološki pridelavi.

Pri odstiranju listov iz okolice grozdja pazite, da ga opravljate postopno in ne povzročite **sončnih ožigov**.

V primeru **neurja s točo**, prednostno zaščitite trse s pripravki v kombinaciji z bakrom ali na osnovi aktivne snovi folpet.

Razmiki med tretiranjimi naj bodo do 10 dni.

Pri uporabi fitofarmaceutskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.

Datum objave obvestila: 06.08.2020 14:53

Obvestilo prognozičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: BAJEC Domen

Pripravil: **Domen Bajec**

[Seznam registriranih FFS](#)

