

117. OBVESTILO O VARSTVU OLJČNIKOV - 27.08.2020 14:43 - Zaključeno



Pavje oko in oljkova siva pegavost

V oljčnikih, kjer je bila spomladi in poleti opažena močnejša okuženost z omenjenima glivičnima boleznima priporočamo preventivno škropljenje s fungicidom na osnovi bakra.

Uporabimo lahko pripravek **Cuprablau Z 35 WP** v odmerku 2 kg/ha (0,3% priprava pri porabi 660 l vode/ha) ali **Cuprablau Z 35 WG** v odmerku 1,6 - 2 kg/ha ali **Nordox 75 WG** v odmerku 1,25 kg/ha.

Glavni znaki pavjega očesa so okrogle sive pege na listih in močno odpadanje listov v spodnjem delu krošnje. Na bolezen sta posebno občutljivi Istrska belica in Oblica.

Bakrovi pripravki imajo poleg **fungicidnega tudi odvrtaalni učinek na oljčno muho**. Učinek je zadovoljiv le pri nizki populaciji oljčne muhe.

Od organskih fungicidov lahko proti **pavjemu očesu** uporabimo **Score 250 EC** v odmerku 0,5 l/ha.

AKTIVNA SNOV	FFS	ODMEREK	KARENCA
- bakrov oksiklorid	Cuprablau-Z 35 WG	1.6-2 kg/ha	14 dni
	Cuprablau-Z 35 WP	2 kg/ha	14 dni
- bakrov oksiklorid	Nordox 75 WG	1,25 kg/ha	14 dni
- bakrov oksid	Score 250 EC	0,5 l/ha	30 dni
- difenkonazol			

Pri ekološki pridelavi oljk je dovoljena le uporaba pripravkov na osnovi bakra.

Bodite pozorni na karencu pripravkov! Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

Pripravil: Matjaž Jančar

Datum objave obvestila: 27.08.2020 14:43

Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Objavil/a: JANČAR Matjaž

Pripravil: **Matjaž Jančar**, tel.: 05 630 40 60

Seznam registriranih FFS



