



Napovedi za vso Slovenijo - Kmetijski inštitut Slovenije / Koščičarji / 1. Varstvo breskev, nektarin in marelic

1. Varstvo breskev, nektarin in marelic - 02.03.2021 11:09 - Zaključeno



Na večini rastišč so breskve in nektarine že v fazi nabrekanja brstov (BBCH 03-09), medtem ko so marelice tik pred začetkom odpiranja brstov (BBCH 59). V času brstenja s preventivno uporabo bakrovih pripravkov preprečujemo okužbe brstov s povzročitelji bolezni kot so **listna luknjičavost koščičarjev**, **breskova kodravost**, **rožičavost češpelj**, ter različne vrste **monilij**. Baker prav tako deluje fungicidno in baktericidno na nekatere druge glive in bakterije, ki prezimujejo v ali na lesu (**bakterijski ožig koščičarjev**). Uporabite lahko pripravke kot so Badge WG, Cuprablau Z 35 WG, Cuprablau Z 35 WP, Cuprablau Z Ultra WP ter na breskvah in nektarinah tudi Nordox 75

WG. Za zatiranje zimskih jajčec in prezimelih nimf škodljivcev, kot so **listne uši**, **kaparji** lahko uporabite pripravke na podlagi parafinskega olja kot sta Frutapon in Ovitex.

Kjer so marelice že prešle v fazo začetka cvetenja, je v primeru napovedanega dežja potrebo opraviti varstvo pred **cvetno monilijo**. Glede na vremenske razmere in dolžino obdobja cvetenja, je škropljenje običajno potrebno opraviti enkrat do dvakrat. Za ta namen so registrirani fungicidi: Chorus 50 WG, Duaxo koncentrat, Prolectus, Serenade ASO, Signum, Switch 62,5WG, Topsin - M in Zenby.

Pri uporabi pripravkov bodite pozorni na priporočene minimalen temperature zraka ter škropljenje opravite pred napovedanimi padavinami. Učinkovitost fungicidov bo večja, če bomo poskrbeli tudi za druge preventivne, sanitarne ukrepe v nasadu, predvsem dosledno odstranjevanje mumij iz krošenj.

Datum objave obvestila: 02.03.2021 11:09

Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije

Objavil/a: David Snoj, Primož Žigon, Meta Zemljič

Pripravili: **David Snoj, Primož Žigon. Uredila: Meta Zemljič**

[Seznam registriranih FFS](#)

