



7. OBVESTILO O VARSTVU PEČKARJEV - 15.03.2021 10:19 - Zaključeno



Nizke nočne temperature, ki se bodo nadaljevale tudi v prihodnjih dneh, so nekoliko zavrle rast in razvoj pečkatih vrst sadja. Še vedno opažamo zelo velike razlike v stopnji fenološkega razvoja sadnih vrst, ki so sortno, pred vsem pa mikrolokacijsko pogojene. Padavine v preteklih dneh so že ustvarile pogoje za prve okužbe s škrlupom. Zato pridelovalcem še naprej svetujemo rabo sredstev na osnovi bakra (**Badge WG, Cuprablau Z 35 WP, Cuprablau Z 35 WG, Cuprablau Z 50 WP, Cuprablau Z ultra WP, Kocide 2000 ali Nordox 75 WG**). Z bakrovimi pripravki varujete pečkarje tudi pred okužbami z različnimi povzročitelji bolezni lesa ter bakterijo povzročiteljico hruševega ožiga (**Nordox 75 WG, Badge WG**).

Sadjarjem še naprej svetujemo tudi redno pregledovanje nasadov in ocenjevanje napadenosti cvetnih brstov zaradi jablanovega cvetožera. Nizke nočne temperature nekoliko zmanjšujejo aktivnost hroščkov, dnevne pa še vedno omogočajo njihov razvoj. Zatiranje priporočamo v primerih, ko je presežen prag škodljivosti. Za nasade s slabšim cvetnim nastavkom je prag postavljen pri 15 % poškodovanih brstov, za nasade z dobrim nastavkom pa pri 30 % poškodovanih brstov. Škodljivca lahko zatirate s sredstvom **Imidan 50 WG**. Uporabite ga lahko najkasneje 14 dni pred cvetenjem, ker je strupen za čebele. Priporočljivo je opraviti škropljenje v toplem vremenu, ko se hroščki aktivno hranijo. Izjemno dovoljenje za zatiranje jablanovega cvetožera je tudi v letošnjem letu dobil insekticid **Asset Five**, ki je dovoljen tudi v ekološki pridelavi. V fazi brstenja se lahko z njim tretira dvakrat na istem zemljišču. Sredstvo ima dovoljenje za 120 dni od 11.3.2021 dalje.

V območjih, kjer je razvoj počasnejši in so drevesa še v fazi brstenja, lahko še preventivno uporabite pripravek s parafinskim oljem kot je **Ovitex ali Frutapon** z namenom zatiranja jajčec in ličink škodljivcev kot so **listne uši, navadna pršica, rdeča sadna pršica, ameriški kapar** in drugi. Pripravka sta primerna tudi za ekološko pridelavo pečkarjev. Hruševe nasade pa med brstenjem varujte pred sesajočimi žuželkami kot je npr. **hruševa bolšica**. Padavine v preteklih dneh so po večini izprale nanose kaolinskih glin, zato svetujemo ponovno apikacijo pripravkov kot sta **Cutisan ali Malusan**, ki sta dovoljena tudi v ekološki pridelavi.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila!

Datum objave obvestila: 15.03.2021 10:19

Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije

Objavil/a: David Snoj, Primož Žigon, Meta Zemljič

Pripravili: **David Snoj, Primož Žigon. Uredila: Meta Zemljič**

[Seznam registriranih FFS](#)

