



9. OBVESTILO O SPOMLADANSKEM ZATIRANJU PLEVELOV V ŽITIH - 24.03.2021 11:36 - Zaključeno



V prihodnjih dneh bodo na področju Savinjske in Koroške regije dnevne temperature nad 12 °C. Od 26. marca dalje bodo tudi nočne temperature nad 0 °C. Posevki ozimnin so večinoma v fenofazah razraščanja. Jari posevki se še sejejo, že posejani posevki jarin so večinoma v fazah vznika. Ob dvigu temperatur in po napovedanih padavinah, bodo posevki in pleveli začeli intenzivno rasti. Uspeh varstva pred pleveli je odvisen predvsem od: pravilne ocene zapleveljenosti, izbire primernega herbicida in pravočasne ter kakovostne aplikacije. Žito je na konkurenco plevelov najbolj občutljivo v času razraščanja žit, ko zapleveljenost najbolj ovira razvoj žit in posledično zmanjšuje pridelek.

Pred uporabo herbicida ali kombinacije več herbicidov natančno preberite priložena navodila za uporabo in jih ob aplikaciji dosledno upoštevajte!

Legenda za tabelo na naslednjih straneh:

ČAS RABE: faza razvoja žit po BBCH

BBCH 00 : takoj po setvi

BBCH 13 : tretji list razgrnjen

BBCH 21 : začetek razraščanja, prvi stranski poganjek zaznaven

BBCH 25 : sredina razraščanja

BBCH 30 : začetek kolenčenja

BBCH 31 : 1. kolence vsaj 1 cm nad mestom razraščanja

BBCH 32 : 2. kolence vsaj 2 cm nad 1. kolencem

BBCH 37 : viden zg. list (zastavičar), je še zvit

BBCH 39 : zastavičar že popolnoma zravn

BBCH 49: vidne prve rese

VRSTA PLEVELA:

E: enoletni

VEČL: večletni

DVOL: dvoletni

OZ: ozkolistni

Š: širokolistni

PL: pleveli

*za FFS velja omejitev uporabe na najožjih vodovarstvenih območjih (WO1), pri pridelovalcih v izbranih KOPOP ukrepih!

**zaloge v uporabi do...

MU = manjše uporabe (»Učinkovitost in fitotoksičnost FFS pri uporabi na navedenih gojenih rastlinah ni bila preverjena, zato odgovornost v zvezi z uporabo tega FFS na navedenih gojenih rastlinah prevzame uporabnik«).

Tabela 1: (spodaj)

Herbicidi za spomladansko rabo v žitih v RS v letu 2021

Fitofarmacevtsko sredstvo (aktivna snov)	Odmerek na ha	Delovanje na vrste plevelov	ŽITO (uporaba v žitu)	Čas rabe (BBCH žit), Opombe
ADENTIS tribenuron 75 %	20 g/ha	E. Š. PLEVELI	oz., jara pšenica, oz., jari ječmen	spomladi BBCH 31-39
ALISTER NEW diflufenikan 12 % + jodosulfuron 0,75 % + mezosulfuron 0,9 %	1,0 L/ha	OZ. in Š. PLEVELI	oz. pšenica	BBCH 12-29
ALLIANCE diflufenikan 60 % + metsulfuron 6 %	100 g/ha	E. Š. PLEVELI	oz. pš., oz. ječ., oz. rž, tritikala, jara pš., jari ječ.	spomladi BBCH 13-29
ALLY SX metsulfuron 20 %	30 g/ha	E. Š. PLEVELI	oz. (pš., ječ., pira, rž, tritikala), jara: pš., ječ., oves	ozimine: BBCH 21-39 jarine: BBCH 12-39
*ARRAT dikamba 50 % + tritosulfuron 25 %	200 g/ha	E. in VEČL. Š. PLEVELI	oz., jara pšenica, oz., jari ječmen	BBCH 13-29, priporočeno dodati DASH HC 0,5 L/ha
ATLANTIS STAR jodosulfuron 0,9 % + mezosulfuron 4,5 % + tienkarbazon 2,25 %	200-333 g/ha	OZ. in Š. PLEVELI	oz. pšenica, ozimna tritikala	samo spomladi BBCH 13-32
AXIAL pinoksaden 5 %	0,6 – 1,2 L/ha	E. OZ. PLEVELI	oz., jara pšenica, oz., jari ječmen	samo spomladi BBCH 13-39
AXIAL ONE florasulam 0,5 % + pinoksaden 4,5 %	1,0 - 1,3 L/ha	E. Š. in OZ. PLEVELI	oz., jara pšenica, oz., jari ječmen	samo spomladi BBCH 11-37
*BASAGRAN 480 bentazon 48 %	2,0 L/ha	E. in nekateri VEČL. Š. PLEVELI	pšenica, ječmen, rž, oves, tritikala	BBCH 21-30
*BIATHLON 4D florasulam 5,4 % + tritosulfuron 71,4 %	70 g/ha	E. in VEČL. Š. PLEVELI	oz., jara pšenica, rž, ječmen, oves, tritikala, pira	spomladi BBCH 13-30-(39), priporočeno dodati DASH HC 1,0 L/ha
BONACA fluroksipir 25 %	0,6-0,8	E. Š. + nekateri VEČL. Š.	oz. pšenica, oz. ječmen	BBCH 12-39

	L/ha	PLEVELI		
BOUDHA metosulfuron 25 % + tribenuron 25 %	20 g/ha	E. Š. PLEVELI	oz., jara pšenica, oz., jari ječmen, oz. rž, oz. tritikala, MU oz. in jari oves	spomladi ozimine BBCH 21-39, jarine BBCH 12-39
CLYDEFX florasulam 0,1 % + fluroksipir 10 %	1,5 L/ha	E. in VEČL. Š. PLEVELI	oz. pš., oz. ječ., jara pš., jari ječ., jari oves, ozimna rž, ozimna tritikala, oz. trda pš. (durum)	spomladi BBCH 22-45, BBCH 22-44, BBCH 23-31, spomladi BBCH 26-39, spomladi BBCH 17-32, spomladi BBCH 29-37
CORELLO DUO florasulam 1,42 % + piroksulam 7,08 %	170 - 265 g/ha	OZ. in Š. PLEVELI	oz. pšenica, oz. rž, tritikala, pira	spomladi BBCH 21-31 + močilo Nu-Film 0,1 L/ha
CORIDA tribenuron 75 %	20 g/ha	E. Š. PLEVELI	oz., jara pšenica, oz., jari ječmen	spomladi BBCH 31-39
*DUPLOSAN KV mekoprop - P 60 %	2,0 L/ha	Š. PLEVELI	oz., jara pšenica, oz., jari ječmen	BBCH 21-31
*DUPLOSAN KV 600 mekoprop - P 60 %	1,5 L/ha	Š. PLEVELI	oz: (pš., ječ., rž, tritikala), jara: pš., ječ., oves	BBCH 13-29
*EMCEE MCPA 75 %	1,0 L/ha	Š. PLEVELI	oz: (pš., ječ., oves, rž, tritikala), jara: (pš., ječ., oves, rž)	BBCH 31-39 BBCH 13-32
ERGON metsulfuron 6,8 % + tifensulfuron 68,2 %	70 g/ha 60 g/ha	E. in VEČL. Š. PLEVELI	oz. pšenica, jara pš., j. ječmen	oz., j. pš. BBCH 12-39 j. ječmen BBCH 13-39

ESTERON 2,4-D 2-EHE 90,5 %	0,75 – 1,0 L/ha	E. Š. PLEVELI	oz., jara pšenica, ječmen, tritikala	BBCH 22-32, na vrste <i>Polygonum</i> deluje zgolj zaviralno!
FINY metosulfuron 20 %	30 g/ha	E. Š. PLEVELI	oz. (pš., rž, tritikala)	BBCH 23-39, priporoča se spomladansko škropljenje!
FLAME tribenuron 50 %	30 g/ha	Š. PLEVELI	oz. pšenica, oz., jari ječmen	spomladi BBCH 13-39
			oz. pšenica, oz.	ozimine BBCH 12-

FLUROSTAR 200 fluoksipir 20 %	1,0 L/ha 0,75 L/ha	E. Š. PLEVELI in plezajoča lakota (<i>Galium aparine</i>)	ječmen, rž, tritikala jara (pšenica, ječmen)	31 jarine BBCH 12-39
GRANSTAR SUPER 50 SX ** tribenuron 25 % + tifensulfuron 25 %	60 g/ha	Š. PLEVELI	oz: pš., ječ., rž in oz. tritikala jara pš., ječ., oves	**zaloge v uporabi do 31.7.2021 spomladi BBCH 17-32
GRODYL amidosulfuron 75 %	40 g/ha	Š. PLEVELI	pšenica, ječmen, oves, tritikala, rž, pira	BBCH 13-37
HERBOCID XL 2,4-D 60 %	1,25 L/ha	E. in VEČL. Š. PLEVELI	oz., jara (pšenica, ječmen, tritikala), oz., rž	BBCH 24-29
HUSSAR OD jodosulfuron 10 %	0,1 L/ha	E. in nekat. VEČL. Š. PL. in nekateri OZ. PLEVELI	oz., jara pšenica, oz., jara ječmen, rž, tritikala	ozimine: BBCH 21- 37 jarine: BBCH 13-29
HUSSAR PLUS jodosulfuron 5,0 % + mezosulfuron 0,75 %	0,2 L/ha 0,15 L/ha	E. Š. in OZ. PLEVELI	oz: pš, rž, tritikala jara: pš., ječmen	škrop. le spomladi ozimine: BBCH 13- 32 jarine: BBCH 13-30
HUSSAR STAR jodosulfuron 3,3 % + tienkarbazon 2,5 %	0,2 - 0,3 kg/ha	E. Š. in OZ. PLEVELI	oz: pš, rž, tritikala	spomladi BBCH 21-32 + močilo MERO 1 L/ha
LANCELOT SUPER aminopirid 30 % + florasulam 15 %	33 g/ha 25 g/ha	Š. PLEVELI	oz: pš, rž, tritikala jara: pš., ječmen	BBCH 21-32 BBCH 13-29 + dodati močilo Nu- Film 0,1 L/ha
LECTOR DELTA diflufenikan 50 %+ florasulam 5 %	0,1 L/ha	Š. PLEVELI	oz: pš., ječ., rž, tritikala jara: pš., ječmen	spomladi BBCH 21-32
*LONTREL 100 klopiralid 10 %	1,0 – 1,2 L/ha	Š. PLEVELI	ozimna pšenica	BBCH 21-31
*LONTREL 72 SG klopiralid 72 %	170 g/ha	nekateri Š. PLEVELI	pšenica, ječmen, oves	BBCH 21-31
MEZZO metsulfuron 20 %	20 – 30 g/ha 30 g/ha	E. in VEČL. Š. PLEVELI	oz., jara pšenica, oz., jara ječmen, tritikala, oves	pš., oves, tritikala BBCH 12-39 ječmen BBCH 13- 39
MUSTANG 306 SE 2,4-D 2-EHE 45,24 % + florasulam 6,25 %	0,4 - 0,6 L/ha	E. Š. PLEVELI	oz., jara pšenica, oz., jara ječmen	BBCH 21-31
MUSTANG FORTE 2,4-D 18 % + aminopirid 1 % +	1,0 L/ha	Š. PLEVELI	oz: (pš., ječ., rž, tritikala), jarine: (pš., ječ.,	ozimine: BBCH 21- 32

florasulam 0,5 %	0,8 L/ha		oves)	jarine: BBCH 13-32
PALLAS 75 WG piroksulam 7,5 %	120 – 250 g/ha	E. OZ. in Š. PLEVELI	oz., jara pš., tritikala, rž	spomladi BBCH 12-32 + močilo Nu-Film 0,1 L/ha
QUELEX florasulam 10 % + halauksifen 10,42 %	50 g/ha	Š. PLEVELI	oz: (pš., ječ., rž, pira, tritikala), jara: pš., ječmen	spomladi BBCH 21-32 + dodatek močila
SARACEN MAX florasulam 20 % + tribenuron 60 %	25 g/ha	Š. PLEVELI	oz., jara ječmen, oz., jara oves, oz. pšenica, oz. rž, oz. tritikala	ozimine: BBCH 12-39 jarine: BBCH 12-32

SAVVY metsulfuron 20 %	20 – 30 g/ha 30 g/ha	E. in VEČL. Š. PLEVELI	oz., jara pšenica, oz., jara ječmen, tritikala, oves	pš., oves, tritikala BBCH 12-39 ječmen BBCH 13-39
SEKATOR OD amidosulfuron 10 % + jodosulfuron 2,5 %	0,15 L/ha	E. Š. + nekateri VEČL. Š. PLEVELI	oz., jara pšenica, oz., jara ječmen rž, tritikala	BBCH 25 - 32
SEKATOR PLUS 2,4-D 28,7 % + amidosulfuron 2,5 % + jodosulfuron 0,625 %	0,6 L/ha	Š. PLEVELI	oz: (pš., ječ., rž, tritikala), jara: pš., ječmen	samo spomladi ozimine: BBCH 21-32 jarine: BBCH 13-32
STARANE FORTE fluroksipir 33,3 %	0,54 L/ha	E. Š. + nekateri VEČL. Š. PLEVELI	oz., jara pšenica, oz., jara ječmen, oves, rž, tritikala, pira	BBCH 21 - 32
STOMP AQUA pendimetalin 45,5 %	2,9 L/ha	E. OZ. PL. in nekateri Š. PLEVELI	oz. pš., durum pš., oz. ječ., oz. rž, tritikala, jara ječmen	BBCH 00 – 30, jara ječ. pred vznikom BBCH 00 – 07
TANDUS 200 EC fluroksipir 20 %	2,0 L/ha 1,0 L/ha 0,75 L/ha	Š. PLEVELI	oz.(pš., ječmen), oz. rž, tritikala, jara (pš., ječmen), oves	BBCH 12 – 45 BBCH 12 – 31 BBCH 12 – 39 BBCH 12 – 31
TBM 75 WG tribenuron 75 %	20 g/ha	E. Š. PLEVELI	oz., jara pšenica, ječmen, oves, tritikala, oz. rž	BBCH 12 - 33
*U 46 M-fluid MCPA–DMA 94,3 %	1,0 L/ha	E. in VEČL. Š. PLEVELI	oz., jara pšenica, oz., jara ječmen, rž, tritikala	BBCH 23-39
XANADU			oz., jara pšenica (tudi durum pšenica),	samo spomladi ozimine (BBCH 21-

bensulfuron 50 % + metsulfuron 4 %	100 g/ha	E. Š. PLEVELI	ječmen, oves, rž, tritik.	39) jarine (BBCH 13- 39)
---------------------------------------	-------------	---------------	------------------------------	--------------------------------

Datum objave obvestila: 24.03.2021 11:36

Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Objavil/a: SILVO Zveplan

Pripravil: **Silvo Zveplan**

[Seznam registriranih FFS](#)

