

10. OBVESTILO O VARSTVU KROMPIRJA PRED PLEVELI - 26.03.2021 10:26 - Zaključeno



Večina kmetovalcev in vrtničarjev bo v prihodnjih dneh sadila krompir. Nekateri so ga posadili že pred kratkim. Posajen krompir v tem času kali.

Za zatiranje plevelov v krompiriščih imamo v Sloveniji v letu 2021 dovoljenih 26 selektivnih herbicidov.

OPOZORILO! *FFS – za fitofarmacevtsko sredstvo velja omejitev uporabe na najožjih vodovarstvenih območjih (WO1), pri pridelovalcih v izbranih KOPOP ukrepih!

Preglednica št. 1: V Sloveniji dovoljeni selektivni herbicidi v krompirju v letu 2021

FFS aktivna snov v %	Odmerek na ha	Karenca (dni)	OPOMBE
AGIL 100 EC propakvizafop 10	0,75-1,5 L	30	Za zatiranje enoletnih in večletnih ozkolistnih plevelov: 0,75-1,0 L/ha za zatiranje enolet. trav, trave od 2 listov do sr. razraščanja (BBCH 12-25). 1,0-1,5 L/ha za zatiranje plazeče pirmice v (BBCH 12-14); za njivski lisičji rep, navadni srakoperec, gluhi oves, angleško ljuljko v (BBCH 12-25). Škropimo, ko je krompir v razvojnih fazah od treh listov do popolne razraščenosti (BBCH 13-39). V zgodnjih sortah krompirja uporaba ni dovoljena!
ANGELUS klomazon 36	0,25 L	Zagotov. s č. uporabe	Za zatiranje enoletnega širokolistnega plevela. Tako po setvi in pred vznikom posevka, v razvojni fazi do začetka tvorbe stebila (BBCH 00-07). Za doseganje optimalnega delovanja sredstva se priporoča uporabo v času takoj po setvi in pred vznikom plevela. Za optimalno delovanje je potrebna zadostna vlažnost tal. Do slabšega delovanja sredstva lahko pride v primeru tretiranja na zelo suhih tleh ali če tretiranju sledi daljše sušno obdobje. Ne priporoča se uporaba sredstva v tleh, ki vsebujejo več kot 10 % organske snovi.
*BASAGRAN 480 bentazon 48	1,5-2 L	42	Za zatiranje enoletnega in nekaterih vrst večletnega širokolistnega plevela po vzniku plevela. Sredstvo uporabimo pri višini krompirja do 10 cm. Temperatura zraka ne sme biti višja od 25 °C.
BOXER prosulfokarb 80	5 L	Zagotov. s č. uporabe	Za zatiranje ozkolistnega in širokolistnega plevela. Po sajenju tik pred vznikom krompirja (BBCH 00-09) na dobro oblikovanih grebenih. Sredstvo se lahko tretira samo z napravami na traktorski pogon.
*BUZZIN metribuzin 70	0,75 kg	Zagotov. s č. uporabe	Se uporablja kot selektivni herbicid za zatiranje enoletnega širokolistnega in nekaterih vrst ozkolistnega plevela v krompirju po sajenju in pred vznikom krompirja. Sredstva se ne sme uporabiti v posevkih namenjenih pridelavi semenskega krompirja!
CHALLENGE aklonifen 60	4,0 L	90	Za zatiranje širokolistnega in ozkolistnega plevela. Po sajenju, vendar pred vznikom krompirja (BBCH 00-08). Za dobro delovanje je pomembna vlaga v tleh. Dolga karenca!
CHANON aklonifen 60	3,0 L	Zagotov. s č. uporabe	Za zatiranje nekaterih vrst širokolistnega in ozkolistnega plevela. Uporaba po sajenju, vendar pred vznikom krompirja.
CLOMATE	0,25 L	Zagotov.	Za zatiranje nekaterih vrst enoletnega širokolistnega plevela.

klomazon 36		s č. uporabe	Po sajenju, pred vznikom nasada, vendar najpozneje 7 dni po sajenju. Gomolji gojenih rastlin naj bodo med tretiranjem prekriti z vsaj 2 cm prsti. Za optimalno delovanje je potrebna zadostna vlažnost tal.
FOCUS ULTRA cikloksidim 10	2-4 L ali 1-2 L+ Dash HC	56	Za zatiranje enoletnih in večletnih ozkolistnih plevelov in samosevcev žit. Tretira se, ko so enoletni ozkolistni pleveli in samosevna žita v razvojni fazi od dveh pravih listov do konca razraščanja (BBCH 12-29) in večletni ozkolistni pleveli v razvojni fazi od prvih treh do petih pravih listov (BBCH 13-15) oziroma so veliki do 15 cm, krompir pa v razvojni fazi od razvitih dveh do devet pravih listov (BBCH 12-19). Enoletni ozkolistni pleveli in samosevci žit: 2 L/ha ali 1 L/ha + 1 L/ha Dash HC. Večletni ozkolistni pleveli: 4 L/ha ali 2 L/ha + 2 L/ha Dash HC. Mešanica Focus ultra+FFS na podlagi aktivne snovi bentazon lahko povzroči fitotoksičnost.
FUSILADE FORTE fluazifop-p-butil 15	0,8-1,3 L	90	Za zatiranje enoletnega ozkolistnega plevla in ljulk (<i>Lolium</i> spp.), razen enoletne latovke (<i>Poa annua</i>). V razmerah majhne do srednje stopnje zapleveljenosti v odmerku 0,8-1,3 L/ha. Tretira se v razvojni fazi pred cvetenjem, pred tvorbo gomoljev, preden se vrste sklenejo. Dolga karenc!
FUSILADE MAX fluazifop-p-butil 12,5	1,6 L	90	Za zatiranje enoletnega ozkolistnega plevla in ljulk (<i>Lolium</i> spp.), razen enoletne latovke (<i>Poa annua</i>). V razmerah majhne do srednje stopnje zapleveljenosti v odmerku 1,6 L/ha. Tretira se v razvojni fazi pred cvetenjem, pred tvorbo gomoljev, preden se vrste sklenejo. Dolga karenc!
*METRIC klomazon 6 + metribuzin 23,3	1,0-1,5 L	Zagotov. s časom uporabe	Za zatiranje enoletnih ozkolistnih in širokolistnih plevelov v krompirju pred vznikom: 1,5 L/ha - za zatiranje srakonje in pasjega zelišča, za ostale plevela 1,0 L/ha Sredstvo se ne sme uporabljati na zelo lahkih in peščenih tleh ter na tleh, ki vsebujejo več kot 10% organske snovi! Uporaba pred vznikom plevla in 7 dni pred vznikom krompirja. Sredstvo se lahko uporablja samo ob uporabi traktorske škroplilnice.
*PLATEEN WG 41,5 metribuzin 17,5 + flufenacet 24	2-2,5 kg	Zagotov. s časom uporabe	Za zatiranje enoletnih ozkolistnih plevelov in enoletnih širokolistnih plevelov. Uporabimo ga po sajenju, pred vznikom krompirja. Fitotoksičnost možna v izredno neugodnih vremenskih razmerah (nizke temp., veliko padavin, razmočenost tal). Sredstvo se lahko uporablja samo ob uporabi traktorske škroplilnice.
PROMAN metobromuron 50	3 L	Zagotov. s časom uporabe	Za zatiranje enoletnega širokolistnega in nekaterih vrst enoletnega ozkolistnega plevla pred vznikom krompirja (BBCH 00). V zgodnjih sortah krompirja, katere imajo vegetacijo krajšo od 115 dni, uporaba ni dovoljena.
*RIM 25 WG rimsulfuron 25	60 g + 0,1 % močilo	Zagotov. s časom uporabe	Za zatiranje nekaterih vrst enoletnega in večletnega širokolistnega in ozkolistnega plevla. Uporaba po vzniku, ko ima krompir od enega do sedem listov (BBCH 11-17). Optimalni čas za tretiranje s sredstvom je po vzniku plevla, ko ima ozkolistni plevel od tri do pet listov (BBCH 13-15) in širokolistni plevel od dva do štiri liste (BBCH 12-14).
*RINCON 25 SG rimsulfuron 25	60 g + močilo	Zagotov. s časom uporabe	Za zatiranje nekaterih vrst ozkolistnega in širokolistnega plevla. Po vzniku plevla in krompirja, ko je krompir v fazah od začetka razgrinjanja prvih listov do začetka sklepanja vrst (BBCH 10-30).
SELECT SUPER kletodim 12	1,0-2,5 L	56	Za zatiranje vseh vrst enoletnega ozkolistnega plevla v odmerku 1 L/ha, za zatiranje enoletne latovke (<i>Poa annua</i>) v odmerku 2 L/ha; tretira se v razvojni fazi od konca razraščanja naprej (od BBCH 29), za zatiranje plazžeče pirnice (<i>Agropyron repens</i>) v odmerku 2,5 L/ha. Krompir se tretira od razvojne faze razvitih prvega para listov do faze, ko se 30% rastlin stika med vrstami (BBCH 12-33).
*SENCOR SC 600 metribuzin 60	0,15 - 0,75 L	42	Za zatiranje enoletnega širokolistnega in nekaterih vrst ozkolistnega plevla. 1. <u>po sajenju pred vznikom krompirja</u> v odmerku 0,75 L/ha (7,5 ml na 100 m ²), pred vznikom je na istem zemljišču dovoljeno eno tretiranje v rastni dobi. 2. <u>po vzniku krompirja</u> , v času ko je plevel v fazi kličnih listov do 2 razvitih pravih

			listov v odmerku 0,15 L/ha. V primeru naknadnega vznika plevla se tretiranje ponovi z enakim odmerkom. Interval med tretiranjmi naj znaša od 10-14 dni, pri čemer se drugo tretiranje opravi najpozneje do stadija, ko ima rastlina na glavnem stebelu razvitih devet listov (do BBCH 19). Sredstvo se lahko uporablja samo ob uporabi traktorske škroplilnice, pršilnika! Ne uporabljati pri sortah Jaerla, SV 77/40 in 76/48, Dobrin, Eva, Jetta, Vóran in Wineta. Pazljivost pri novih, nepreizkušenih sortah!
SHARPEN 33 EC pendimetalin 33	3-5 L	Zagotov. s č. uporabe	Selektivni herbicid za zatiranje enoletnega ozkolistnega in širokolistnega plevla pred vznikom krompirja, po oblikovanju grebenov (BBCH 000-008).
SHARPEN PLUS pendimetalin 40	2,5- 4 L	Zagotov. s č. uporabe	(staro ime SHARPEN 40 SC) Selektivni herbicid za zatiranje enoletnega ozkolistnega in širokolist. plevla pred vznikom krompirja, po oblikovanju grebenov (BBCH 000-008).
SINOPIA klomazon 2,4 + metobromuron 50	3 L	Zagotov. s č. uporabe	Za zatiranje nekaterih vrst enoletnega širokolistnega plevla in omejevanje številčnosti populacije navadne kostrebe (<i>Echinochloa crus-galli</i>). Uporaba v odmerku 3 L/ha, takoj po sajenju gomoljev (do 5 dni po sajenju), pred vznikom krompirja.
STALLION SYNC TEC klomazon 3 + pendimetalin 33,3	3 L	Zagotov. s časom uporabe	Za zatiranje enoletnih ozkolistnih in širokolistnih plevelov in plazeče pirnice v krompirju pred vznikom krompirja in plevelov! Tretira se čim prej po sajenju krompirja in sesedanju grebenov, najpozneje 7 dni pred vznikom krompirja! Sredstva se ne sme uporabljati v semenskem krompirju! Sredstva se ne sme uporabljati na peščenih in zelo rahlih tleh ter na tleh, ki vsebujejo več kot 10 % organske snovi.
STOMP AQUA pendimetalin 45,5	2,9 L	Zagotov. s časom uporabe	Za zatiranje enoletnega ozkolistnega in nekaterih vrst širokolistnega plevla. Uporaba po saditvi, pred vznikom. Ni dovoljeno uporabljati na tleh z deležem organske snovi nad 6% (močvirska/šotna tla) ter na zelo lahkih tleh (peščena, prodnata, kamnita tla), v času suše ali v času pred napovedanimi obilnejšimi padavinami.
TARGA SUPER kvizalofop p-etil 5	1,2-2,0 L	45	1,2 L/ha za zatiranje enoletnega ozkolistnega plevla, 2,0 L/ha za zatiranje plazeče pirnice (<i>Agropyron repens</i>). Tretira se, ko je krompir v fazah od razvitih dveh listov do začetka cvetenja (BBCH 12-61). Uporaba FFS ob uporabi ročne nahrbtnne škroplilnice ni dovoljena!
*TAROT 25 WG rimsulfuron 25	40-50 g + močilo	Zagotov. s časom uporabe	Za zatiranje enoletnega (40 g/ha + močilo) in večletnega ozkolist. plevla (50 g/ha + močilo) ter nekaterih vrst širokolistnega plevla. Na kraških in propustnih tleh se sredstva ne sme uporabljati! Sredstva se ne sme mešati z organskimi fosfornimi insekticidi! Uporaba od treh listov krompirja do začetka sklepanja vrst (BBCH 103-301), plevel naj ima razvite 2-3 liste.
ZETROLA propakvizafop 10	0,75-1,5 L	30	Za zatiranje enoletnih in večletnih ozkolistnih plevelov: 0,75-1,0 L/ha za zatiranje enolet. trav, trave od 2 listov do sr. razraščanja (BBCH 12-25). 1,0-1,5 L/ha za zatiranje plazeče pirnice v (BBCH 12-14); za njivski lisičji rep, navadni srakoprec, gluhi oves, angleško ljuljko v (BBCH 12-25). Škropimo, ko je krompir v razvojnih fazah od treh listov do popolne razraščenosti (BBCH 13-39). V zgodnjih sortah krompirja uporaba ni dovoljena!

Datum objave obvestila: 26.03.2021 10:26

Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Objavil/a: SILVO Zveplan

Pripravil: **Silvo Zveplan**

Seznam registriranih FFS

