



12. Zatiranje plevelov v žitih - 29.03.2021 09:03 - Zaključeno



V jeseni posejana žita so sedaj v fazi razraščanja, jara žita pa šele vznikajo. Kjer ozimim še niste zavarovali pred pleveli v jeseni, je med razraščanjem primeren čas za ta ukrep, če so izpolnjeni tudi drugi pogoji za dobro delovanje herbicidov, predvsem glede temperatur in vlage. V letošnjem marcu so kljub krajšim toplim obdobjem prevladovali dnevi z mrzlimi nočmi in jutranjo slano, zaradi pogosto vetrovnega vremena je marsikje zgornji sloj tal izsušen, kar še dodatno ovira razvoj rastlin. V prihodnjih dneh je napovedan dvig temperatur, ob koncu tedna tudi nekaj padavin. Če bo dežja dovolj lahko po tem pričakujemo pospešen razvoj tako žit kot plevelov.

Za spomladansko zatiranje plevelov izberemo pripravke ali kombinacije glede na stanje zapleveljenosti v posevku in poskrbimo, da ukrep izvedemo ob pravem času. Nekatera sredstva je treba uporabiti do konca razraščanja žit, nekatera lahko rabimo še med kolenčenjem, ko so pleveli v fazi intenzivne rasti. Učinkovitost ukrepa je praviloma boljša dokler so pleveli majhni in so žitom tudi manj konkurenčni, zato, če se le da, s škropljenjem ne odlašajmo predolgo. Učinkovitost nekaterih sredstev je lahko manjša na zelo suhih tleh, pazimo tudi, da ne škropimo takrat, kadar so rastline v stresu bodisi zaradi suše, nizkih temperatur, bolezni ali drugih dejavnikov. V spodnji tabeli so navedeni pripravki, registrirani za spomladansko rabo v žitih.

Pred škropljenjem natančno preberite in upoštevajte sredstvom priložena navodila!

Tabela: Herbicidi za zatiranje plevelov v žitih (iz baze FFS, marec 2021)

Pripravki aktivna snov	Odmerek (kg, l/ha)	Registracija in čas rabe	Pleveli
Adentis, Corida, Flame, TBM 75 WG tribenuron-metil	0,02	P, J od prvega kolence in najpozneje do faze zastavičarja (BBCH 31-39)	Enoletni širokolistni pleveli; ko so v fazi intenzivne rasti in imajo razvit šesti list
Alister new diflufenikan + jodosulfuron + mezosulfuron	1	P zgodaj spomladi, v razvojnem stadiju od dveh listov do konca razraščanja (BBCH 12-29)	Njivski lisičji rep in širokolistni pleveli
Alliance diflufenican + metsulfuron metil	0,1	P, J po vzniku, od prvega lista do konca razraščanja (BBCH 10-29)	Enoletni širokolistni pleveli
Ally SX, Finy, Savvy metsulfuron-metil	0,03	P, J, Pi, O, R, T v jarih ž.: od drugega lista do zastavičarja (BBCH 12-39); v oz. ž. od začetka razraščanja do zastavičarja (BBCH 21- 39)	Enoletni širokolistni pleveli
Atlantis star jodosulfuron + mezosulfuron + tienkarbazon- metil	0,2 - 0,33	P, T od treh listov do drugega kolence (BBCH 13-32)	Enoletni ozkolistni in nekateri širokolistni pleveli

Axial pinoksaden	0,6 - 1,2	P, J od treh listov do zastavičarja (BBCH 13-39)	Enoletni ozkolistni plevi, ko so v razvojni fazi od 1-6 listov ali ko imajo razvita 3-4 kolenca.	
Axial one florasulam + pinoksaden	1 - 1,3	P, J od prvega lista do faze, ko je viden zastavičar (BBCH 11-37)	Nekateri širokolistni in ozkolistni plevi	
Basagran 480 bentazon	2,0	P, J, O, R, T od razraščanja do začetka kolenčenja (BBCH 21-31)	Nekateri širokolistni plevi	
Biathlon 4D florasulam + tritosulfuron	0,07	P, J, Pi, R, T od tretjega lista do razvitega zastavičarja (BBCH 13 do 39)	Enoletni in večletni širokolistni plevi	
Boudha metsulfuron + tribenuron	0,02	P, J, R, T (oves: manjše uporabe) od začetka razraščanja in najpozneje do faze zastavičarja (BBCH 21-39)	Enoletni širokolistni plevi	
Bonaca, Flurostar 200, Starane forte, Tandus 200, fluoksipir	0,6 - 0,8	P, J, R, T od dveh razvitih listov do zastavičarja (BBCH 12-39)	Enoletni širokolistni in nekateri večletni širokolistni plevi	
Clyde FX florasulam + fluoksipir	1,5	P, J, O, R, T od faze šest stranskih poganjkov in najdlje do stopnje zastavičarja (BBCH 26-39)	Enoletni in večletni širokolistni plevi	
Corello duo florasulam + piroksulam	0,170 - 0,265	P, Pi, R, T od začetka razraščanja do faze prvega kolenca (BBCH 21-31)	Ozkolistni in širokolistni plevi	
Duplosan KV, mekoprop – P	2,0	P, J, od razraščanja do kolenčenja (BBCH 21-31)		Širokolistni plevi; tretirati pri temperaturah zraka višjih od 12°C, oz. razmerah, ki pospešujejo rast posevka (toplota, vlaga).
Duplosan KV 600 mekoprop – P	1,5	P, J, O, R, T med razraščanjem žit (BBCH 13-29)		
Ergon metsulfuron-metil + tifensulfuron-	0,06-0,07	P, JJ od razvitih dveh listov do faze zastavičarja	Enoletni in večletni širokolistni plev	

metil		(BBCH 12-39);	
Emcee MCPA	1,0	P, J, O, R, T Jara ž.: od treh listov do drugega kolenca (BBCH 13 - 32) Oz. ž.: od prvega kolenca do zastavičarja (BBCH 31 - 39)	Širokolistni plevli; v času tretiranja naj bodo plevli v zgodnjih razvojnih fazah in aktivno rastoči.
Esteron 2,4-D 2-EHE	0,75 - 1,0	P, J, T Od konca razraščanja do drugega kolenca (BBCH 22-32)	Enoletni širokolistni plevli
Grodyl amidosilfuron	0,04	P, J, Pi, O, R, T od treh listov do začetka pojavljanja zgomjega lista (BBCH 13-37)	Širokolistni plevli
**Granstar super 50 SX tifensulfuron-metil + tribenuron-metil	0,06	P, J, O, R, T od faze, ko imajo žita razvitih 7 listov, do drugega kolenca (BBCH 17 do 32)	Širokolistni plevli **zaloge v uporabi do 31.7.2021
Herbocid XL 2,4-D	1,25	P, J, R, T od sredine razraščanja do konca razraščanja (BBCH 24-29)	Enoletni in večletni širokolistni plevli
Hussar OD jodosulfuron	0,1	P, J, R, T Oz. ž.: od začetka razraščanja do zgomjega lista (BBCH 21 do 37); jara ž.: od tretjega lista do konca razraščanja (BBCH 13 do 29)	Enoletni širokolistni in nekateri ozkolistni ter nekateri večletni širokolistni plevli; Najboljše delovanje, ko je ozkolistni pl. v fazi dveh listov in do konca razraščanja, in širokolistni pl. v fazi 2 - 6 listov.
Hussar plus jodosulfuron + mezosulfuron	0,2	P, J, R, T od faze treh listov do drugega kolenca (BBCH 13-32).	Enoletni širokolistni in ozkolistni plevli; Najboljše delovanje, ko imajo širokolistni pl. 2-4 liste, ozkolistni pl. pa od začetka do sredine razraščanja.
Lector delta diflufenikan + florasulam	0,075 - 0,1	P, J, R, T od začetka razraščanja do drugega kolenca (BBCH 21-32)	Širokolistni plevli
Mustang 306 SE 2,4 D + florasulam	0,4 - 0,6	P, J, T od začetka razraščanja do prvega kolenca (BBCH 21-31)	Enoletni širokolistni plevli

Mustang forte 2,4 D + aminipirolid + florasulam	0,8 - 1,0	P, J, O, R, T od začetka razraščanja do drugega kolenca (BBCH 21-32)	Širokolistni plevli; ko imajo 2-6 listov
Pallas 75 WG piroksulam	0,12 - 0,25	P, R, T od faze dveh listov do drugega kolenca (BBCH 12-32)	Ozkolistni in širokolistni plevli
Quelex flurasulam + halauksifen-metil	0,05	P, J, Pi, R, T spomladi od faze začetnega razraščanja do faze drugega kolenca (BBCH 21-32)	Širokolistni plevli
Sekator OD amidosulfuron + jodosulfuron	0,15	P, J, R, T oz. ž.: od tretjega lista do začetka razvoja zgomjega lista (BBCH 13-37); jara ž.: od tretjega lista do konca razraščanja (BBCH 13-29)	Enoletni širokolistni in nekateri ozkolistni plevli ter nekatere vrste večletnega širokolistnega plevla
Xanadu bensulfuron metsulfuron	0,1	P, J, O, R, T oz. ž. : od začetka razraščanja do zastavičarja (BBCH 21-39); jara ž.: od tretjega lista do zastavičarja (BBCH 13-39)	Enoletni širokolistni plevli; najboljše rezultate se doseže, če se tretira majhne aktivno rastoče plevle.

P-pšenica, J-ječmen, JJ-jari ječmen, Pi-pira, O-oves, R-rž, T-tritikala

Datum objave obvestila: 29.03.2021 09:03

Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije

Objavil/a: Urbančič Zemljič Meta

Pripravili: **Meta Urbančič Zemljič in Neja Marolt**

[Seznam registriranih FFS](#)

