

18. VARSTVO VINSKE TRTE - 12.04.2021 13:39 - Zaključeno



Vinska trta brsti, razlike v razvoju pa so po območjih in po sortah zelo različne. Na toplejših lokacijah sorte, ki so hitrejšje v razvoju, že odpirajo brste, medtem ko so ti pri glavnini sort na vinorodnih območjih celinske Slovenije še v fazi nabrekanja. Ko se bodo brsti pričeli odpirati lahko vinograde poškropite z enim od registriranih žveplovih pripravkov kot so **Cosan**, **Kumulus DF**, **Microthiol dispers**, **Microthiol special**, **Pepelin WG**, **Thiovit jet** ali **Windex 80 WG**. Uporaba žvepla ima posreden učinek na zmanjševanje populacije škodljivih pršic kot sta **trsna listna pršica šiškarica**, ki povzroča erinozo in **pršica trsne kodravnosti**, ki povzroča akarinozo. Ukrep je smiselno opraviti predvsem v vinogradih, kjer se pršice pogosteje pojavljajo in povzročajo na listih večjo škodo. Svetujemo, da škropljenje opravite ob koncu tedna, ko se bo ozračje predvidoma otoplilo, saj delovanje žvepla pri temperaturah nižjih od 15 °C nima učinka. Proti škodljivim pršicam na vinski trti je mogoče ukrepati tudi v kasnejši fenološki fazi, ko so mladice dolge 2 do 5 cm (BBCH 12- 15) s pripravkom **Vertimec pro**. Dokler so brsti še zaprti, lahko v primeru prerezamnožitve **rdeče sadne pršice** ali **gabrove pršice** uporabite pripravek **Red fox**, ki delno vpliva tudi na zmanjševanje okužb s **črno pegavostjo**.

Datum objave obvestila: 12.04.2021 13:39

Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije

Objavil/a: David Snoj, Primož Žigon, Meta Zemljič

Pripravili: **David Snoj, Primož Žigon. Uredila: Meta Zemljič**

[Seznam registriranih FFS](#)

