

22. VARSTVO OREHOV - 14.04.2021 15:02 - Zaključeno



Nasadi orehov začenjajo z brstenjem.

Za preventivno varstvo pred **bakterijskimi okužbami** s povzročitelji iz rodov *Xantomonas* in *Pseudomonas* priporočamo nanos bakrovih pripravkov. V poštev pridejo: **CUPRABLAU Z 35 WG** (1,6 – 1,7 kg/ha), **CUPRABLAU Z 35 WP** (2 kg/ha), **CUPRABLAU Z 50 WP** (2,4 kg/ha) ali **CUPRABLAU Z UKTRA WP** (3,1 kg/ha).

Nanos opravite v mirnem vremenu, v večernem času, ko ni možnosti vpliva na čebele. Pred uporabo sredstev nevarnih za čebele obvezno poskrbite tudi za odstranitev cvetoče podrasti.

Pri tem pozorno preberite navodila in upoštevajte vse ukrepe za varovanje okolja.

Datum objave obvestila: 14.04.2021 15:02

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: BAJEC Domen

Pripravil: **Domen Bajec**

[Seznam registriranih FFS](#)

