

## 15. VARSTVO JABLAN IN HRUŠK - 15.04.2021 14:46 - Zaključeno



### POZEBA

Na sadjarskih lokacijah Celjske in Koroške regije so se v noči s 14. na 15. april temperature zraka ponovno spustile pod ledišče (od - 1,3-Slovenske Konjice do - 4 °C -Ponikva) Vremenska napoved napoveduje tudi v noči 15./16. april padec temperatur pod ledišče. o tehnoloških ukrepih po pozebi so podani na: <https://www.kmetijski-zavod.si/sl-si/novosti-in-nasveti/objava/id/263/ukrepi-po-spomladanskih-pozebah-v-sadovnjakih-podravske-in-savinjske-regije>.

Na območju Celjske regije so jablane povprečno na opazovane lokacije vstopile v fenološko fazo **cvetenja**. Zgodaj cvetoče sorte so že v fazi polnega cvetenja (BBCH 64 - 65). Tudi hruške so v povprečju na opazovane lokacije in sorte v fenološki fazi polnega cvetenja (BBCH 64 - 65).

| Sorta                      | Razvojna faza  |              |
|----------------------------|----------------|--------------|
|                            | Fleckinger     | BBCH         |
| Carjevič                   | F <sub>2</sub> | 65           |
| Idared                     | F <sub>2</sub> | 64           |
| Braeburn, Jonagold         | F              | 62 -63       |
| Gala, Zlati delišes, Fuji, | E2 - F         | 59 - 60 - 61 |
| Elstar                     | E2 - F         | 59 -60       |

Na območju Koroške so jablane v povprečju na opazovane sorte v fenoloških fazah BBCH 56 - 57-59, hruške pa BBCH 57-60.

### Škrlup in pepelasta plesen jablan

Na opazovanih sadjarskih lokacijah je med 12. in 14. aprilom padlo od 13,2 (Slovenske Konjice) do 23,8 mm (Kasaze) dežje. Na vseh opazovanih lokacijah so bili izpolnjeni pogoji za srednjo do močno okužbo. Tudi v naravi smo zabeležili izbruh askospor.

Naslednje škropljenje jablan in hrušk proti škrlupu približajte in opravite pred naslednjimi padavinami. Škropljenje opravite z enim od kontaktnih pripravkov na osnovi a.s. ditianon: **Delan Pro** (2,5 L/ha) ali **Alcoban** (0,75kg/ha); od konca cvetenja tudi **Delan 700 WG** (0,75 kg/ha). Prav tako še vedno lahko uporabite pripravke na osnovi a.s. mankozeb: **Avtar 75 NT** (2 kg/ha), **Dithane DG Neotic** (2 kg /ha), **Dithane M-45** (2 kg/ha), **Manfil plus 75 WG** (2 kg/ha), **Mankoz 75 WG** (2 kg/ha), **Penncozeb 75 DG** (2,5 kg/ha), **Pinozeb M – 45** (2 kg/ha) ali z aktivno snovjo metiram **Polyram DF** (2 kg/ha).

V primeru, da vas presenetijo padavine ali napovedi več dnevnih obdobij s padavinami dajte prednost pripravkom iz skupine anilinopirimidinov, ki dobro delujejo tudi pri nizkih temperaturah kot so: **Chorus 50 WG** (0,45 kg/ha), **Scala** (1,125 L/ha), **Pyrus 400 SC** (1L/ha) ali **Batalion 450 SC** (0,7 – 1 L/ha). Vsem naštetim pripravkom iz skupine anilinopirimidinov, dodate enega od zgoraj naštetih kontaktnih fungicidov. Škropljenje lahko opravite tudi s pripravkom **Faban** (1,2 L/ha). Pripravek vsebuje kombinacijo aktivnih snovi pirimetanil in ditianon, zato mu ni potrebno dodati kontaktnega fungicida.

Za zmanjšanje infekcijskega potenciala je pri sortah, ki so občutljive na jablanovo pepelovko uporaba pripravkov na osnovi močljivega žvepla učinkovita in smiselna smo v primeru temperatur nad 15°C. Samo v kolikor, bodo ti pogoji izpolnjeni, dodajte enega od pripravkov na osnovi močljivega žvepla kot so: **Azumo WG**, **Cosan**, **Pepelin**, **Kumulus DF**, **Microthiol special**, **Microthiol disperss**, **Thiovit jet**, **Vindex 80 WG**, **Biotip Sulfo 800 SC**, **Pol sulphur 800 SC** ali **Symbiotica Fito –tekoče žveplo** ali **Vertipin**, v odmerku 3 kg/ha oz. 3L/ha.

### Hrušev ožig

Vremenske razmere trenutno ne ustvarjajo pogojev cvetne okužbe in za razvoj bakterije *Erwinie amylovora*, povzročiteljice hruševega ožiga.

Datum objave obvestila: 15.04.2021 14:46

Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus

Pripravila: **Alenka Ferlež-Rus**

Seznam registriranih FFS

