

24. VARSTVO KOŠČIČARJEV - 03.05.2021 12:45 - Zaključeno



Koščičaste sadne vrste razen sliv so večinoma zaključile s cvetenjem. Po koncu cvetenja je potrebno spremljati pojave škodljivcev in ob preseženem pragu škodljivosti ukrepati. Pozorni bodite predvsem na pojav kolonij črne češnjeve uši, pri kateri je prag škodljivosti presežen, če najdete kolonije na več kot treh odstotkih poganjkov. Škodljivca lahko zatirate z insekticidi kot so **Afinto**, **Teppeki** in **Movento SC 100**. V nasadih sliv in češpelj, kjer ste spremljali nalet češpljeve grizlice in ugotovili presežen prag škodljivosti ukrepajte z enim od insekticidov. Za zatiranje češpljeve grizlice ali listnih uši lahko uporabite insekticid **Mospilan 20 SG**. Za zatiranje uši pa tudi **Movento SC 100**, **Teppeki** ali **Afinto**. V nasadih breskev in nektarin lahko za zatiranje sive breskove uši in drugih škodljivcev uporabite insekticide kot so **Mospilan 20 SG**, **Pirimor 50 WG**, **Afinto** in **Teppeki**.

Škropljenje z insekticidi opravite le, če so drevesa že popolnoma odcvetela !

Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja. Pred škropljenjem je potrebno pokositi cvetočo podrast, škropljenje pa opraviti v nočnem ali večernem času oz. takrat, ko so čebele v panjih.

Datum objave obvestila: 03.05.2021 12:45

Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije

Objavil/a: David Snoj, Primož Žigon, Meta Zemljič

Pripravili: **David Snoj, Primož Žigon. Uredila: Meta Zemljič**

[Seznam registriranih FFS](#)

