

29. VARSTVO AMERIŠKIH BOROVNIC - 03.05.2021 13:00 - Zaključeno



Ameriške borovnice počasi začenjajo s cvetenjem. V tem obdobju je izjemno pomembno varovanje cvetov pred sekundarnimi okužbami z monilijo ameriških borovnic. Kljub temu, da v letošnjem letu vremenske razmere niso bile ugodne za razvoj apotecijev ter primarne okužbe, pridelovalcem svetujemo preventivno varstvo. Hkrati je potrebno cvetove borovnic zavarovati pred okužbami z nekaterimi drugimi povzročitelji bolezni, ki povzročajo antraknozo in sivo plesen. Za ta namen lahko uporabite enega izmed naslednjih fungicidnih sredstev: **Signum**,

Switch 62,5 WG, **Teldor SC 500**, **Serenade ASO**, **Amylo-X** ali **Taegro**. Pri zgodnjih sortah, ki še brstijo, lahko za varstvo pred borovničevo monilijo do cvetenja uporabite sredstva na osnovi a.s. difenkonazol kot so **Folicur EW 250**, **Mavita 250 EC** ali **Score 250 EC**.

Datum objave obvestila: 03.05.2021 13:00

Obvestilo prognostičnega centra: Osrednja Slovenija/Kmetijski inštitut Slovenije

Objavil/a: David Snoj, Primož Žigon, Meta Zemljič

Pripravili: **David Snoj, Primož Žigon**. Uredila: **Meta Zemljič**

[Seznam registriranih FFS](#)

