



31. OBVESTILO ZA ZATIRANJE BOLEZNI V OZIMNIH ŽITIH - 05.05.2021 10:55 - Zaključeno



Fenološki razvoj posevkov pšenice in ječmena

Posevki ozimne pšenice so na območju JV Slovenije večinoma v razvojni fazi kolenčenja (BBCH 30-35). Ozimni ječmen pa je v fazi vidnih prvih resic (BBCH 47) oz. na bolj zgodnjih legah že v sredini klasenja (BBCH 55).

Zatiranje bolezni

Tudi v letošnjem letu beležimo dobro prezimila žita z zelo malo okužbami. Se pa v prihodnje zaradi povečane prisotnosti vlage pričakuje povečan pojav glivičnih bolezni. Pozorni bodite na preseže pragove (več o tem si lahko preberete v prispevku 'Glivične bolezni v žitih 2021' na naši spletni strani <http://www.kmetijskizavod-nm.si/nasveti/varstvorastlin>).

Pri **ječmenu** je prag za **ječmenov listni ožig** presežen, ko je na listih razvitih 35 % posameznih peg, pri **ječmenovi mrežasti pegavosti** pa če se na 10% rastlin pojavijo pege vsaj na treh listih. Za prvo tretiranje priporočamo uporabo pripravka, ki bo zatiral obe bolezni in ki bo deloval kurativno ali eradikativno. Izbirate lahko med naslednjimi sredstvi: **CHAMANE** (1 L/ha), **COMRADE** (1 L/ha), **LIBRAX** (1,33 – 2,0 L/ha), **MIZONA** (1 L/ha), **PRIAXOR EC** (1,5 L/ha), **PROSARO** (1,0 L/ha), **PROTENDO 300 EC** (0,65 L/ha), **RETEGO** (1,25 L/ha), **REVYSTAR** (1,5 L/ha), **REVYTREX** (1,125 L/ha), **REVYSTAR XL** (0,75 – 1,5 L/ha), **TAZER 250 SC** (0,8 L/ha), **ZAMIR** (1,5 L/ha), **ZANTARA** (1,5 L/ha) ali **ZOXIS 250 SC** (1 L/ha).

V zadnjih letih v ječmenu opazamo povečan pojav okužb z **ramularijsko pegavostjo ječmena** (*Ramularia collo-cygni*). Priporočamo, da pregledate posevke in tam kjer je ozimni ječmen v razvojni fazi vidne prve resice (BBCH 47 - 49) izvedete zaščito posevka (s kasnejšim tretiranjem ne boste dosegli željenega učinka). Tam kjer ste prvo škropljenje proti ječmenovemu listnemu ožigu in na ječmenovi mrežasti pegavosti **že izvedli** priporočamo uporabo enega izmed naslednjih pripravkov: **ASCRA XPRO** (1,2 L/ha), **ELATUS ERA** (1 L/ha), **ELATUS PLUS** (0,75 L/ha), **IMTREX XE** (2 L/ha), **SEGURIS XTRA** (1 L/ha) ali **SILTRAXPRO** (1 L/ha). Tam kjer zaščita posevka ječmena **še ni bila izvedena** pa priporočamo da izberete pripravek, ki deluje na vse tri glivične bolezni: **LIBRAX** (1,33 – 2,0 L/ha), **PRIAXOR EC** (1,5 L/ha), **REVYSTAR** (1,5 L/ha), **REVYCARE** (1,5 L/ha), **REVYTREX** (1,125 L/ha), **REVYSTAR XL** (0,75 – 1,5 L/ha) ali **ZANTARA** (1,5 L/ha).

Na **pšenici** je prag za **listno pegavost** presežen, če najdemo pege na zgornjih treh listih pri več kot 10 % rastlin. Prvo škropljenje lahko opravite z enim od naslednjih pripravkov: **ASCRA XPRO** (1,5 L/ha), **BOUNTY** (0,6 L/ha), **BUZZ ULTRA DF** (0,33 kg/ha), **CARAMBA** (1,5 L/ha), **CHAMANE** (1 L/ha), **COMRADE** (0,75 L/ha), **ELATUS ERA** (1 L/ha), **ELATUS PLUS** (0,75 L/ha), **EMINENT 125 EW** (1 L/ha), **FAXER** (1 L/ha), **IMTREX XE** (2 L/ha), **KEYPRO** (1 L/ha), **LIBRAX** (1,33-2,0 L/ha), **MIRADOR FORTE** (1,5 – 2 L/ha), **MIRADOR XTRA** (0,6 – 1,0 L/ha), **MIZONA** (1 L/ha), **ORIUS 25 EW** (1 L/ha), **PLEXEO** (1,5 L/ha), **PRAKTIS** (0,8 L/ha), **PRIAXOR EC** (1,5 L/ha), **PROCEED** (2 L/ha), **PROCER 300 EC** (0,65 L/ha), **PROMINO 300 EC** (0,65 L/ha), **PROTENDO 300 EC** (0,65 L/ha), **PRAKTIS** (0,8 L/ha), **PROSARO** (1 L/ha), **REVYCARE** (1,5 L/ha), **REVYSTAR** (1,5 L/ha), **REVYSTAR XL** (0,75 – 1,5 L/ha), **REVYTREX** (1,125 L/ha), **SEGURIS XTRA** (1 L/ha), **SILTRAXPRO** (1 L/ha), **SIRENA** (1,5 L/ha), **TARTAROS 300 EC** (0,65 L/ha), **TAZER 250 SC** (0,8 L/ha), **SEGURIS XTRA** (1 L/ha), **ZANTARA** (1,5 L/ha), **ZAMIR** (1,5 L/ha) ali **ZOXIS 250 SC** (1 L/ha).

Pri uporabi fitofarmaceutskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.

Datum objave obvestila: 05.05.2021 10:55

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: RODIČ Karmen

Uredila: **Karmen Rodič**

[Seznam registriranih FFS](#)

