



42. VARSTVO JABLAN IN HRUŠK - 21.05.2021 15:52 - Zaključeno



Možnost za močno primarno okužbo z *jablanovim škrlupom* se je razvila med 18. in 19. majem; ob nadaljevanju deževja pa se je med 19. in 20. dodatno izoblikovala še ena. Natančnejši prikazi izračunov za vam najbližje merilno mesto so dostopni na povezavi: http://agromet.mko.gov.si/index.asp?ID=Varstvo/modeli/VI/VI_0.asp. V zadnjih dneh ob vsakih padavinah zabeležimo tudi izredno intenzivno sproščanje askospor. Za varstvo nasadov še naprej skrbite z rednim obnavljanjem fungicidne obloge. Poskrbite, da bodo nasadi zaščiteni pred naslednjimi predvidenimi padavinami. Upoštevajte tudi močno priraščanje listne površine. Uporabite lahko: **ALCOBAN** (0,75 kg/ha), **DELAN 700 WG** (0,75 kg/ha), **DELAN PRO** (2,5 l/ha), **SYLLIT 400 SC** (1,9 l/ha), oz. **SYLLIT 544 SC** (1,4 l/ha), **AVTAR 75 NT** (2 kg/ha), **DITHANE DG NEOTEC** (2 kg/ha), **DITHANE M-45** (2 kg/ha), **MANFIL PLUS 75 WG** (2 kg/ha), **MANFIL 75 WG** (2 kg/ha), **MANKOZ 75 WG** (2 kg/ha), **PINOZEB M-45** (2 kg/ha), **PENNZOZEB 75 DG** (2,5 kg/ha), **POLYRAM DF** (2 kg/ha), **MERPAN 80 WDG** (1,88 kg/ha), **SCAB 80 WG** (1,9 kg/ha), **SCAB 480 SC** (3,13 l/ha), **ORTHOCIDE 80 WG** (2 kg/ha), **MERPLUS** (2 l/ha). V kolikor vam ne uspe zaščititi nasada pravočasno, lahko v kombinaciji s prej navedenimi pripravki uporabite: **CHORUS 50 WG** (0,45 kg/ha), **MYTHOS** (1,5 l/ha), **PYRUS 400 SC** (1 l/ha), **SCALA** (1,125 l/ha), **BATALION 450 SC** (0,7 – 1,0 l/ha) ali **FABAN** (1,2 l/ha); uporabi se lahko brez dodanega dotikalnega sredstva, ki imajo določeno zdravilno delovanje za nazaj. S še daljšim delovanjem za nazaj so na razpolago: **SCORE 250 EC** (0,2 l/ha), **DIFCOR 250 EC** (0,2 l/ha), **MAVITA 250 EC** (0,2 l/ha), ter po zaključenem cvetenju tudi **DIFENZONE** (0,2 l/ha), **DUAXO KONCENTRAT** (3,3 l/ha) ali **DOMARK 100 EC** (0,4 l/ha). Za varstvo pred škrlupom lahko uporabite tudi **CURATIO – ŽVEPLENO APNENA BROZGA** (6 l/ha na meter višine krošnje), ki ima dovoljenje za nujne primere v zvezi z varstvom rastlin in je primerna za ekološko pridelavo.

Vremenski pogoji so zelo ugodni tudi za razvoj *jablanove pepelovke*. Močne okužbe obvladujte s: **SERCADIS** (0,25 l/ha) ali **SERCADIS PLUS** (0,72 l/ha), **LUNA EXPERIENCE** (0,75 l/ha), **STROBY WG** (0,2 kg/ha), **ZATO 50 WG** (100-150 g/ha), **TERCEL** (2,5 kg/ha). Sicer pride v poštev dodajanje sredstev na osnovi žvepla (v trenutnem odmerjanju 6 kg, oz. l/ha).

Pozorni bodite na morebitne pojave *hrušvega ožiga*. Zaradi pozebe je v nasadih prisotno pocvitanje, ki omogoča širjenje bakterije *Erwinia amylovora* s cvetnimi okužbami. Izražanje bolezenskih znamenj (<https://www.gov.si/teme/hrusev-ozig-erwinia-amylovora/>) bi bilo pričakovati zlasti na območju zahoda Dolenjske (Žužemberk, Trebnje,...) v sadovnjakih jablane, hruške ali kutine, oz. tudi okrasnih gostiteljskih rastlinah (fotinja, šmarna hrušica, japonska kutina, glog, nešplja, panešplja, ognjeni trn, skorš, jerebika,...). V primer suma na okužbo, obvestite fitosanitarno inšpekcijo ali najbližjo Službo za varstvo rastlin (<http://agromet.mko.gov.si/index.asp?ID=Varstvo/default.asp>).

Posebno pozornost namenite ukrepanju proti *krvavi uši*, ki se seli v višje predele dreves. Prag škodljivosti je 12 kolonij na 100 poganjkov oz. 5 do 8 % napadenih vej. Uporabite pripravek **PIRIMOR 50 WG** (0,75 kg/ha) ali **MOVENTO SC 100** (1,9 l/ha). Slednji je primernejši v nasadih, kjer se pojavljajo še *listne uši*, *jablanova listna hrčica* ali *ameriški kapar*. V primeru močnega napada je smiselno tretiranje z njim ponoviti po 14 dneh. Poskrbite za dobro omočenost (vsaj 800 l vode na ha); svetujemo tudi uporabo močil ter drugih dodatkov, ki pomagajo pri razporejanju sredstev.

V nasadih, kjer je bila v preteklih letih močno zastopana *rdeča sadna pršica*, preverite njeno prisotnost. V primeru, da imate na zalogi še pripravek **ENVIDOR SC 240** (0,6 l/ha; nevaren za čebele; poraba zalog dovoljena do 01.10.2021) in je prag škodljivosti (5 osebkov na list) presežen, so trenutne okoljske razmere z visoko zračno vlago ugodne za njegovo rabo. Ostala sredstva bodo prišla v poštev v nadaljnjem razvoju pršice.

Priporočamo, da nanos opravite v večernem času, ko je bolj mirno ozračje in ni možnosti vpliva na čebele. Pred uporabo sredstev nevarnih za čebele obvezno poskrbite tudi za odstranitev cvetoče podrasti.

Pri tem pozorno preberite navodila in upoštevajte vse ukrepe za varovanje okolja.

Datum objave obvestila: 21.05.2021 15:52

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: BAJEC Domen

Pripravil: **Domen Bajec**

Seznam registriranih FFS

