

35. VARSTVO OZIMNIH ŽIT - 27.05.2021 09:23 - Zaključeno



Ozimne pšenice in tritikale sedaj večinoma že klasijo ali so že sklasi in prehajajo v fazo cvetenja, razvoj je odvisen od sorte in območja pridelave. Ko je klas enkrat zunaj je izpostavljen različnim glivičnim okužbam, najbolj škodljive so okužbe s fuzarijskimi glivami, ki poleg nižjega pridelka povzročajo onesnaženost zrnja z mikotoksini. Nevarno obdobje za okužbe klasov s fuzariozami je od konca klasenja do konca cvetenja (BBCH 59-69). Tveganje je veliko v deževnem vremenu in tam, kjer v kolobarju pšenica sledi koruzi. Priporočamo, da posevke, ko sklasi, čimprej zavarujete s katerim od triazolnih pripravkov kot so **Caramba, Prosaro, Praktis, Protendo 300 EC, Plexeo, Sirena, Tartaros 300 EC** in podobni.

V posevkih spremljajte tudi razvoj **listnih uši in rdečega žitnega strgača**. Za zatiranje lahko uporabite katerega od pripravkov kot so **Bulldock 25 EC, Fastac 100 EC, Decis 2,5 EC, Karate zeon 5 CS, Karis 10 CS, Poleci, Evure, Mavrik 240** in podobni.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!

Datum objave obvestila: 27.05.2021 09:23

Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije

Objavil/a: Urbančič Zemljič Meta

Pripravili: **Meta Urbančič Zemljič in Neja Marolt**

[Seznam registriranih FFS](#)

