



Celjska in Koroška regija - Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije / Krompir
/ 39. OBVESTILO O VARSTVU KROMPIRIŠČ PRED ŠKODLJIVCI

39. OBVESTILO O VARSTVU KROMPIRIŠČ PRED ŠKODLJIVCI - 08.06.2021 13:42 - Zaključeno



1. KOLORADSKI HROŠČ (*Leptinotarsa decemlineata*)

V nasadih krompirja smo mestoma opazili povečan pojav odraslih osebkov **koloradskega hrošča** in našli že tudi prve **izlegle** ličinke. **Bodite pozorni na odložena jajčeca na spodnji strani listov in spremljajte razvoj ličink. Odraslih hroščev prve generacije ne zatiramo. V primeru, če so jajčeca odložena na več kot 20 % grmov, in da najdete izleženih 10 do 15 % ličink, opravite škropljenje z enim od insekticidov: Alverde** je najbolj učinkovit za zatiranje mladih ličink, takoj po izleganju iz jajčec; **Benevia** je nov insekticid z dotikalnim in želodčnim delovanjem, deluje na jajčeca in vse razvojne stopnje ličink; **Bulldock EC 25** (zaloge v uporabi le do 20.7.2021); ***Coragen** je kontaktni insekticid z želodčnim delovanjem, tretiranje z njim odsvetujemo v primeru bližajočih se padavin; **Mospilan 20 SG** ima sistemsko delovanje, lahko ga uporabite tudi proti višjim razvojnim stadijem ličink, uporabite ga lahko največ dvakrat letno. V ekološki pridelavi krompirja lahko uporabite insekticide: **Azatin EC, Laser 240 SC, Laser plus, Neemazal T/S** ali pripravek na osnovi piretrina **Raptol koncentrat**. Piretroidi imajo pri visokih temperaturah slabšo učinkovitost! Za dobro učinkovitost vseh sredstev je pomembno, da zatirate ličinke čim nižjih razvojnih stadijev. Foliarno škropljenje (preko listov) proti ličinkam koloradskega hrošča s sistemskimi insekticidi zaščiti krompir za dobo 3-5 tednov ob predpostavki, da je škropljenje opravljeno v skladu z dobro kmetijsko prakso. Odmerek pripravka na hektar je potrebno enakomerno razporediti na površino, pri čemer naj bo poraba vode 300-600 L/ha. Če uporabite kontaktne insekticide, škropljenje po potrebi ponovite po 7-10 dneh. **Pri zgodnjem krompirju bodite pozorni na karenčno dobo (čas od zadnje uporabe sredstva do spravila pridelka)!**

Preglednica 1: Insekticidi za zatiranje koloradskega hrošča v krompiriščih v Sloveniji v letu 2021

INSEKTICIDI ZA ZATIRANJE KOLORADSKEGA HROŠČA V KROMPIRIŠČIH

FFS (pripravek)	Aktivna snov	Odmerek/ha	Karenca (dni)
Alverde	metaflumizon	0,25 L	14
Azatin EC	azadirachtin A	1,5 L	3
Benevia	ciantraniliprol	0,125 L	14
Bulldock EC 25 zaloge v uporabi do 20.7.2021	beta-ciflutrin (piretroid)	0,5 L	7
*Coragen	klorantraniliprol	0,06 L	14
Laser 240 SC	spinosad	0,2 L	7
Laser plus	spinosad	0,04 L	14
Mospilan 20 SG	acetamiprid	0,1kg	14
Neemazal T/S	azadirachtin A	2,5 L	4
Raptol koncentrat	olje ogrščice + piretrin	8,0 L	3

Ob škropljenju upoštevajte vse zakonske predpise o varovanju čebel, upoštevajte predpisane varnostne pasove do voda in karenčne dobe!

Za insekticid označen z zvezdico pred imenom (***FFS**) velja omejitev uporabe na najožjih vodovarstvenih območjih (VVO1), pri pridelovalcih v izbranih KOPOP ukrepih!!!

Datum objave obvestila: 08.06.2021 13:42

Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Objavil/a: SILVO Zveplan

Pripravil: **Silvo Zveplan**

Seznam registriranih FFS



