



58. VARSTVO VINSKE TRTE - 10.06.2021 02:09 - Zaključeno



Na večini leg je vinska trta tik pred cvetenjem (57 – 60 po lestvici BBCH).

Vinogradnike opozarjamo na veliko nevarnost okužb s **peronosporo vinske trte**. Poskrbite za redno obnavljanje zaščitne fungicidne obloge, saj se med nevihtami, ob intenzivnih padavinah, slednja hitro izpere (ko pade 25 l padavin / m², je oslABLJENA). Svetujemo kombinirana sredstva, pri katerih dajte prednost: **FORTUNA GOLD** (5 kg/ha), **ACROBAT MZ WG** (2,5 kg/ha), **FORUM MZ WG** (2,5 kg/ha), (1,6 kg/ha), **FUDAN GOLD** (3 kg/ha), **GETT** (2,5 kg/ha), **EQUATION PRO** (400 g/ha), **MIKAL PREMIUM F** (3 kg/ha, v kolikor ste do sedaj uporabili pripravke na osnovi Al-fosetil), **MOMENTUM TRIO** (3 kg/ha), **MAGMATRIPLE WG** (3 kg/ha), **FORUM STAR** (1,6 kg/ha), **MOXIMATE 725 WG** (med cvetenjem 1,9 kg/ha), **MOXIMATE 725 WP** (med cvetenjem 1,9 kg/ha), **MOXIMATE PLUS** (med cvetenjem 1,9 kg/ha), **FOLPAN GOLD** (do konca cvetenja 2 kg/ha), **RIDOMIL GOLD MZ PEPITE** (2,5 kg/ha), **ARMETIL M** (2,5 kg/ha), **AMPEXIO** (0,5 kg/ha), **DELAN PRO** (3 l/ha); ... Razmik med tretiranjmi naj bo zaradi intenzivnega priraščanja na 7 do 8 dni, razen v primeru padavin, ko je potrebno izprano zaščitno obnoviti.

V primeru **neurja s točo** dajemo prednost pripravkom na osnovi aktivne snovi folpet (*follow, folpan, pergado F, emendo F, mikal, momentum, folpan gold, universalis...*). Pomembno je, da se vinogradi pred tretiranjem osušijo.

Proti **oidiji vinske trte** na najbolj izpostavljenih legah uporabite: **KARATHANE GOLD 350 EC** (0,5 – 0,6 l/ha), **DYNALI** (0,65 l/ha), **MAMTA 250 EC** (0,2 l/ha), **KUSABI 300 SC** (do začetka cvetenja 0,15 l/ha), **MISHA 20 EW** (0,23 l/ha), **SERCADIS** (0,15 l/ha), **BALTAZAR** (0,4 l/ha), **ORIOUS 25 EW** (0,4 l/ha), **LUNA EXPERIENCE** (do nastavka plodiča 0,375 l/ha), **LUNA MAX** (1 l/ha), **COLLIS** (0,4 l/ha),... V poštev pridejo tudi pripravki na osnovi žvepla.

V trenutnem obdobju spremljamo tudi razvoj **ameriškega škržatka**, prenašalca **zlate trsne rumenice**, ki se je v preteklih dneh intenzivno izlegel iz zimskih jajčec in bomo njegovo zatiranje napovedali po zaključenem cvetenju vinske trte.

Nanos opravite v mirnem vremenu, v večernem času, ko ni možnosti vpliva na čebele. Pred uporabo čebelam nevarnih pripravkov odstranite cvetočo podrast in poskrbite vse za njihovo zaščito. Pri uporabi fitofarmaceutskih sredstev pazorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.

Datum objave obvestila: 10.06.2021 02:09

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: BAJEC Domen

Pripravil: **Domen Bajec**

[Seznam registriranih FFS](#)

