



75. OBVESTILO O VARSTVU KROMPIRJA - 17.06.2021 11:24 - Zaključeno



V nižinah Primorske se bo izkop zgodnjega krompirja kmalu začel, pozni krompir pa je pred cvetenjem. Na ostalih višjih območjih (postojnsko, idrijsko, tolminsko) pa so zgodnje sorte pred cvetenjem, pozne sorte oz. pozno sajeni posevki pa še niso strnili vrst. V nižinah Primorske opazujemo ponekod veliko število izleženih ličink koloradskega hrošča. Priporočamo redno pregledovanje posevkov in po potrebi tudi zaščito z enim od registriranih sredstev.

Priporočamo redno pregledovanje krompirišč, da ugotovimo morebitno namnožitev ličink. **Zatiramo jih po posameznih grmih ali po celotni površini, če je v poprečju več kot 10 majhnih ličink na več kot 20 % grmov.** Na insekticide so najbolj občutljive mlade ličinke. Pri uporabi ekoloških sredstev za zatiranje moramo biti na to še posebej pozorni, saj zanesljivo učinkujejo le na komaj izležene ličinke.

Pred vsako uporabo fitofarmacevtskega sredstva skrbno preberite priložena navodila za uporabo in upoštevajte priporočene odmerke in opozorila o varstvu čebel in voda! Pri izkopu ranega krompirja pazite na karenco!

INSEKTICIDI REGISTRIRANI V KROMPIRJU NA DAN 3. 5. 2021

PRIPRAVEK	AKTIVNA SNOV	ODMEREK	DELOVANJE NA	ŠT. TRETIRANJ	KARENCA (dni)
ALVERDE	metaflumizon 24%	0,25 l/ha	Koloradski hrošč	2x	14
BENEVIA	Ciantranilipro 10%	0,125 l/ha	Koloradski hrošč	1x	14
BULLDOCK EC 25 Zaloge v uporabi do: 20.7.2021	beta-ciflutrin 2,5%	0,5 l/ha	Koloradski hrošč	2x	7
CORAGEN	klorantraniliprol 20%	0,06 l/ha	Koloradski hrošč	2x	14
MOSPILAN 20 SG	acetamidiprid 20%	0,1 kg/ha	Koloradski hrošč	2x	14
		0,2 kg/ha	Siva breskova uš		
KARATE ZEON 5 CS	lambda-cihalotrin 5%	0,15 l/ha	Listne uši	1x	7
KARIS 10 CS	lambda-cihalotrin 10%	0,075 l/ha	Listne uši	2x	7
TEPPEKI	flonikamid 50%	0,16 kg/ha	Listne uši	2x	14
AFINTO	flonikamid 50%	0,16 kg/ha	Listne uši	2x	70
PIRIMOR 50 WG Datum veljavnosti: 5.10.2021	pirimikarb 50%	0,5 kg/ha	Listne uši	2x	7
MOVENTO SC 100	Spirotetramat 10 %		Listne uši	4x	14

		0,75 l/ha			
CLOSER	Sulfoksaflor 12%	0,2 l/ha	Listne uši	2x	7
FORCE 1,5 G	Teflutrin 1,5 %	5 kg/ha (Ne sme se uporabljati na zgodnjem krompirju)	Strune, drugi talni škodljivci Brez primerne opreme za inkorporacijo granul, uporaba sredstva ni dovoljena!	1x	Čas uporabe
FORCE EVO	Teflutrin 0,5%	16 kg/ha	za zatiranje ličink hroščev pokalic – strun. Tretira se v času saditve (trosilnik)	1x	Čas uporabe (vsaj 60 dni)
NATURALIS*	Beauveria bassiana, soj ATCC 74040 0,0185%	3 l/ha	Strune, ob saditvi ali ob osipanju	5x	Ni potrebna
OVITEX*	parafinsko olje 81,7%	15 l/ha	Listne uši, od začetka razgrinjanja prvih listov do začetka cvetenja	2x	Ni potrebna
AZATIN EC*	azadirahthin A 2,6%	1,5 l/ha	Koloradski hrošč	3x	3
NEEMAZAL – T/S*	azadirahthin A 1%	2,5 l/ha	Koloradski hrošč, mlade ličinke	2x	4
LASER 240 SC*	spinosad 24%	0,2 l/ha	Koloradski hrošč, takoj po izleganju ličink	2x	7
LASER PLUS *	Spinosad 48 %	0,04 l/ha	Koloradski hrošč	2x	14
RAPTOL KONCENTRAT*	olje navadne ogrščice 82,53% + piretrin 0,459%	8 l/ha	Koloradski hrošč, v hladnih delih dneva	2x	3

Pripravila: A. Poženel, univ. dipl. inž. agr.; KGZS, KGZ Nova Gorica, Kmetijska svetovalna služba;

Vir: Seznam registriranih fitofarmaceutskih sredstev na dan 3.5.2021, MKGP, URSVHVVR

*Sredstvo dovoljeno tudi v **EKOLOŠKEM** kmetovanju.

Datum objave obvestila: 17.06.2021 11:24

Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Objavil/a: Devetak Marko

Pripravil: **Marko Devetak**

Seznam registriranih FFS

