



66. VARSTVO VINSKE TRTE - 23.06.2021 14:44 - Zaključeno



Vinogradi v vinorodni deželi Posavje so v fazi polnega cvetenja, oz. ga že zaključujejo (65 – 69 po lestvici BBCH).

Vremenske razmere z visokimi temperaturami niso optimalne za širjenje **peronosporo vinske trte**, a je vseeno potrebno zaustaviti aktivne okužbe. Svetujemo kombinirana sredstva, kot so: **FORTUNAGOLD** (5 kg/ha), **ACROBAT MZ WG** (2,5 kg/ha), **FORUM MZ WG** (2,5 kg/ha), (1,6 kg/ha), **FUDAN GOLD** (3 kg/ha), **GETT** (2,5 kg/ha), **EQUATION PRO** (400 g/ha), **MIKAL PREMIUM F** (3 kg/ha, v kolikor ste do sedaj uporabili pripravke na osnovi Al-fosetil), **MOMENTUM TRIO** (3 kg/ha), **MAGMA TRIPLE WG** (3 kg/ha), **FORUM STAR** (1,6 kg/ha), **MOXIMATE 725 WG** (med cvetenjem 1,9 kg/ha), **MOXIMATE 725 WP** (med cvetenjem 1,9 kg/ha), **MOXIMATE PLUS** (med cvetenjem 1,9 kg/ha), **FOLPAN GOLD** (do konca cvetenja 2 kg/ha), **RIDOMIL GOLD MZ PEPITE** (2,5 kg/ha), **ARMETIL M** (2,5 kg/ha), **AMPEXIO** (0,5 kg/ha), **DELAN PRO** (3 l/ha),...

V primeru **neurja s točo** dajemo prednost pripravkom na osnovi aktivne snovi folpet (*follow, folpan, pergado F, emendo F, mikal, momentum, folpan gold, universalis...*).

V bujnejših vinogradih narašča nevarnost za okužbe z **oidijem vinske trte**. Izpostavljeni so zlasti kabrniki. Priporočamo pripravke kot so: **LUNA EXPERIENCE** (do nastavka plodiča 0,375 l/ha), **LUNA MAX** (1 l/ha), **KARATHANE GOLD 350 EC** (0,5 – 0,6 l/ha), **DYNALI** (0,65 l/ha), **MAVITA 250 EC** (0,2 l/ha), **KUSABI 300 SC** (med cvetenjem 0,25 l/ha), **MISHA 20 EW** (0,23 l/ha), **SERCADIS** (0,15 l/ha), **BALTAZAR** (0,4 l/ha), **ORIOUS 25 EW** (0,4 l/ha), **TALENDO EXTRA** (po cvetenju 0,13 – 0,3 l/ha), **TALENDO** (0,25 l/ha), **UNICORN DF** (2,2 kg/ha), **MYSTIC 250 EC** (0,4 l/ha), **CUSTODIA** (od začetka cvetenja 0,35 l/ha), **PROSPER CS 300** (1 l/ha), **COLLIS** (0,4 l/ha),... V poštev pridejo tudi **preparati na osnovi žvepla**.

Ameriški škržatek, prenašalec **zlate trsne rumenice**, je po razvoju najbolj množično zastopan na stopnji L1, prisotne so tudi ličinke L2. Zatiranje bomo napovedali, ko se bodo iz zimskih jajčec izlegle vse ličinke, po zaključenem cvetenju vinske trte.

Nanos opravite v mirnem vremenu, v večernem času, ko ni možnosti vpliva na čebele. Pred uporabo čebelar nevarnih pripravkov odstranite cvetočo podrast in poskrbite vse za njihovo zaščito. Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.

Datum objave obvestila: 23.06.2021 14:44

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: BAJEC Domen

Pripravil: **Domen Bajec**

Seznam registriranih FFS

