

63. OBVESTILO O VARSTVU VINOGRADOV št.8 - 01.07.2021 07:39 - Zaključeno



Vinska trta je sedaj večinoma v fenološki fazi BBCH 71 -73 (nastavek plodiča - jagode velikosti prosenih zrn)

Zaradi bujne rasti vinske trte ter napovedanih lokalnih ploh oz. neviht za preprečitev novih okužb s **peronosporo vinske trte** za naslednje škropljenje priporočamo uporabo enega od kombiniranih pripravkov (sistemični oz. polsistemični + kontaktni) kot so: **Acrobat MZ WG** (2,5 kg/ha) ali **Ampexio** (0,5 kg/ha) ali **Armetil M** (2,5 kg/ha) ali **Curzate M 72,5 WG** (2,3 kg/ha) ali **Cymbal** (0,25 kg/ha) ali **Electis 75 WG** (1,5-1,8 kg/ha) ali **Emendo F** (1,5 kg/ha) ali **Enervin** (2,5 kg/ha) ali **Equation pro** (0,4 kg/ha) ali **Folpan Gold** (staro ime Ridomil gold combi pepite, 2,5 kg/ha) ali **Fortuna gold** (3 kg/ha) ali **Forum MZ WG** (2,5 kg/ha) ali **Forum star** (1,6 kg/ha) ali **Fudan Gold** (3 kg/ha) ali **Gett** (2,5 kg/ha) ali **Magma Triple WG** (3 kg/ha) ali **Mikal Flash** (4 kg/ha) ali **Mikal premium F** (3 kg/ha) ali **Momentum F** (4 kg/ha) ali **Momentum trio** (3kg/ha) ali **Moximate 725 WG** oz. **WP** (2,5 kg/ha) ali **Moximate plus** (2,5 kg/ha) ali **Nautile DG** (2,4 kg/ha) ali **Orondis** (0,48 L/ha) ali **Orvego** (0,8 L/ha) ali **Pergado F** (3 kg/ha) ali **Pergado D** (1,4 L/ha) ali **Pergado MZ** (2,5 kg/ha) ali **Pergado SC** (0,6 L/ha) ali **Profiler** (3 kg/ha) ali **Profilux** (2 kg/ha) ali **Reboot** (0,4 kg/ha) ali **Revus** (0,6 l/ha) ali **Ridomil gold MZ Pepite** (2,5 kg/ha) ali **Sanvino** (1,125 kg/ha) ali **Sfinga Extra WDG** (1,5 kg/ha) ali **Tanos 50 WG** (0,4 kg/ha) ali **Twingo** (3 kg/ha) ali **Valis F** (2 kg/ha) ali **Valis M** (2 kg/ha) ali **Zorvec Zelavin** (0,48 L/ha). Priporočamo, da presledki med škropljenji ne bodo daljši kot 8-10 dni.

Uporabiti je mogoče tudi pripravka **LBG-01F34** ali **Sorale LX** v odmerku 4 L/ha (če se uporabljata samostojno) ali 3 L/ha (v kombinaciji z drugimi fungicidi na osnovi aktivnih snovi *folpet* ali *mankozeb*) ali **Delan pro** v odmerku 3 L/ha.

Mogoče je uporabiti tudi kontaktne pripravke s kurativnim delovanjem, kot so: **Daimyo F** (2,5 L/ha) ali **Mildicut** (4 L/ha) ali **Videryo F** (2,5 L/ha) ali **Vincy F** (2,5 L/ha).

Pripravkom **Alleato 80 WG**, **Cymbal**, **Equation pro**, **Profiler**, **Pergado SC** in **Revus** priporočamo dodajanje enega od kontaktnih pripravkov v vsaj polovičnem odmerku.

V **ekološki pridelavi** lahko za zatiranje peronospore uporabite enega izmed naslednjih bakrovih pripravkov: **Badge WG** ali **Cuprablau Z 35 WG** ali **Cuprablau Z 35 WP** ali **Cuprablau Z Ultra WP** ali **Cuproxat** ali **Kocide 2000** ali **Nordox 75 WG**.

Za preprečitev okužb z **oidijem vinske trte** lahko uporabite enega od naslednjih pripravkov: **Baltazar** (0,4 L/ha) ali **Collis SC** (0,4 l/ha) ali **Custodia** (0,525 L/ha) ali **Difcor 250 EC** (0,12 L/ha) ali **Dynali** (0,65 l/ha) ali **Domark 100 EC** (0,3 L/ha) ali **Folicur EW 250** (0,4 L/ha) ali **Karathane Gold 350 EC** (0,6 l/ha) ali **Karbicare** (5 kg/ha) ali **Kusabi 300 SC** (0,3 L/ha) ali **Luna experience** (0,5 l/ha) ali **Luna max** (1 l/ha) ali **Mavita** (0,2 l/ha) ali **Misha 20 EW** (0,23 l/ha) ali **Mystic 250 EC** (0,4 l/ha) ali **Nativo 75 WG** (0,16 kg/ha) ali **Orius 25 EW** (0,4 l/ha) ali **Prosper CS 300** (1 L/ha) ali **Score 250 EC** (0,2 L/ha) ali **Sercadis** (0,15 L/ha) ali **Spirox D** (0,5 l/ha) ali **Star Tebukonazol** (0,4 l/ha) ali **Sythane 20 EW** (0,14 L/ha) ali **Talendo extra** (0,13-0,3 l/ha) ali **Tebusha 25%EW** (0,4 L/ha) ali **Topas 100 EC** (0,3 l/ha) ali **Topaze** (0,3 l/ha) ali **Topsin-M** (1,6 kg/ha) ali **Unicorn DF** (2,2 kg/ha) ali **Vitisan** (9 kg/ha) ali **Vivando** (0,2 l/ha).

Lahko uporabite tudi pripravka **Cabrio top** (2,0 kg/ha) ali **Universalis** (2 L/ha), ki zaradi kontaktne komponente delujeta tudi proti peronospori vinske trte.

Sredstvom za zatiranje **oidija** lahko dodate še enega od pripravkov na osnovi močljivega žvepla, kot so: **Azumo WG** (4-8 kg/ha) ali **Cosan** ali **Kumulus DF** ali **Microthiol special** ali **Microthiol Disperss** ali **Pepelin** ali **Thiovit jet** ali **Vindex 80 WG** v odmerku 3,0-8,0 kg/ha ali **Biotip Sulfo 800 SC** (4 L/ha) ali **Pol-Sulphur 80 WG, WP** (4 kg/ha) ali **Pol-Sulphur 800 SC** (4,0 L/ha) ali **Symbiotica fito – tekoče žveplo** (4,0 L/ha) ali **Symbiotica fito – granulirano žveplo** (4,0 kg/ha) ali **Cosinus** oziroma **Cosavet DF** ali **Močljivo žveplo Karsia DF** (8 kg/ha – v primeru pojava oidija). **Pri temperaturah zraka nad 28°C je pri uporabi močljivih žvepel potrebna previdnost zaradi možnega pojava fitotoksičnosti.**

Prvi metuljički drugega rodu **grozdnih sukačev** so se na feromonske vabe ujeli 27. junija. Optimalni termin za zatiranje drugega rodu **grozdnih sukačev** s pripravkom **Insegar 25 WG** (0,6 kg/ha) je v času **do 4. julija**, termin za uporabo pripravkov: **Affirm** (1,5 kg/ha), **Coragen** (15 ml/hL), **Laser plus** (0,2 L/ha), **Mimic** (0,6 L/ha), **Radiant** (0,35 L/ha), **Steward** (0,0125%) ali **Vertimec pro** (0,75 L/ha) ali pripravki na podlagi *Bacillus thuringiensis*, kot so: **Agree WG** (1 kg/ha) ali **Delfin WG** (0,75 kg/ha) ali **Lepinox plus** (1 kg/ha) pa bo v času **med 3. in 10. julijem**. Pripravki na podlagi *Bacillus thuringiensis* so dovoljeni tudi v ekološki pridelavi.

V primeru pojava **neurij in toče** imajo pri zaščiti vinske trte prednost pripravki, ki vsebujejo a.s. folpet: (**Forum star, Sfinga extra WDG, Pergado F, Folpan Gold, Mikal flash, Mikal premium F in podobni**). V tem primeru priporočamo tudi dodajanje foliarnih gnojil kot so **Protifert LMW, Algoplasmin, Basfoliar aktiv ali podobnih**. Pred uporabo posameznih kombinacij pripravkov in foliarnih gnojil je potrebno v navodilih za uporabo preveriti mešanje zaradi morebitnega pojava fitotoksičnosti.

Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo, zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda I. in II. reda.

V primeru uporabe sredstev, nevarnih za čebele, je potrebno cvetočo podrast pokositi in škropljenje opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih.

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN

Datum objave obvestila: 01.07.2021 07:39

Obvestilo prognostičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor

Objavil/a: MEŠL Miro

Pripravil: **Miro Mešl**

[Seznam registriranih FFS](#)

