

**76. VARSTVO OREHOV - 08.07.2021 15:26 - Zaključeno**

Pridelovalcem orehov svetujemo postavitev privabilnih pasti za spremljanje *orehove muhe*. Po dve rumeni lepljivi plošči s prehranskim privabilom namestite v krošnjo eno na 2 in drugo na višino 6 m nekaj deset metrov m oddaljenih dreves. Ukrepite po zabeleženem začetku naleta muhe. Dovoljenje za varstvo pridelka imajo **IMIDAN 50 WG** (1,5 kg/ha; največ 2× v eni rastni dobi), **LASER 240 SC** (0,15 l/ha, pri porabi vode 3 l na polno razvito drevo; nanos le v spodnji 1/3 krošnje; uporaba priporočena s prehransko vabo NUTREL; največ 3× v eni rastni dobi) in **LASER PLUS** (0,075 l/ha, pri porabi vode 3 l na polno razvito drevo; nanos le v spodnji 1/3 krošnje; uporaba priporočena s prehransko vabo NUTREL; največ 3× v eni rastni dobi).

Na sadnih vrtovih, oz. drevesih v bližini naselja lahko pristopite z **DECIS TRAP OREHOVA MUHA** (50 do 100 pasti na ha) ali pa prekrijete tla pod drevesi s tekstilno kopreno. V tem primeru nameščena koprena / ponjava fizično prepreči izletanje izleglih muh.

**Priporočamo, da nanos opravite v večernem času, ko je bolj mirno ozračje in ni možnosti vpliva na čebele. Pred uporabo sredstev nevarnih za čebele obvezno poskrbite tudi za odstranitev cvetoče podrasti.**

**Pri tem pozorno preberite navodila in upoštevajte vse ukrepe za varovanje okolja.**

Datum objave obvestila: 08.07.2021 15:26

Obvestilo prognoističnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: BAJEC Domen

Pripravil: **Domen Bajec**

[Seznam registriranih FFS](#)

